

AUS DEM FRAUENSPITAL BASEL-STADT

DIREKTOR: PROF. DR. OTTO v. HERFF

\*\*\*\*\*

UEBER

# EKLAMPSIE-BEHANDLUNG

\*\*\*\*\*

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWUERDE

EINER

HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTAET

DER

UNIVERSITAET BASEL

VORGELEGT VON

**PIO DE RIGHETTI**

PRAKTISCHER ARZT AUS DONGOIO



BELLINZONA

S. A. STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO ... GIÀ COLOMBI

1913



AUS DEM FRAUENSPITAL BASEL-STADT

DIREKTOR: PROF. DR. OTTO v. HERFF

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

UEBER

# EKLAMPSIE-BEHANDLUNG

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWUERDE

EINER

HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTAET

DER

UNIVERSITAET BASEL

VORGELEGT VON

**PIO DE RIGHETTI**

PRAKTISCHER ARZT AUS DONGIO

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  
⊕ ⊕ ⊕  
⊕ ⊕  
⊕

BELLINZONA

S. A. STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO ... GIÀ COLOMBI

1913



**Genehmigt auf Antrag von Prof. Dr. Otto v. Herff**

---

Meinen lieben Eltern  
in Dankbarkeit gewidmet





Digitized by the Internet Archive  
in 2026

[https://archive.org/details/IA41546707\\_0050](https://archive.org/details/IA41546707_0050)

# Ueber Eklampsie-Behandlung

(Aus dem Frauenspital Baselstadt)

Die Eklampsie ist heutzutage noch eine der gefürchtesten Komplikationen des Puerperiums, denn trotz aller Mühen ist es noch nicht gelungen, ihr Wesen zu erklären.

Dass man bestrebt war und ist, diesen dunklen Punkt aufzuhellen, beweist die enorme Literatur über Eklampsie, die mit jedem Jahre immer umfangreicher wird. Und so lange das Quid unbekannt bleibt, so lange wird eine kausale Therapie nicht möglich sein.

Die Eklampsie ist vermöge ihrer Häufigkeit und der charakteristischen Symptome schon seit den ältesten Zeiten bekannt, wurde aber früher auf gleiche Stufe mit den epileptischen Krämpfen gestellt, d. h. auf rein nervösen Ursprung zurückgeführt. Erst die Entdeckung des Engländers *Lever*, dass der Harn Eklamptischer Eiweiss in reicher Menge enthält, konnte diese Anschauungen erschüttern. Damit war die Aufmerksamkeit auf die Nieren als erkranktes Organ gelenkt und es wurde die Vermutung nahegelegt, dass das Wesen der Eklampsie in einer Harnstoffintoxikation zu suchen sei. Da man aber auch bei Uraemie Krämpfe kannte, so wollte man die Eklampsie mit der Uraemie identifizieren. Diese uraemische Intoxikation erklärt *Frerichs* aus der Anhäufung von Harnstoff im Blut und seiner Umwandlung in kohlen-saures Ammoniak, unter Wirkung eines im Blute sich bildenden Fermentes. Da diese Theorie durch die chemische Untersuchung nicht bestätigt wurde, wurde sie bald verlassen.

*Spiegelberg*, ein Anhänger der *Frerichs*'schen Theorie, nahm gleichfalls als Ursache der Eklampsie eine schon bestehende Nierenerkrankung an, oder eine akute Erkrankung der Nierengefässe, wahrscheinlich ein von den Uterusnerven her ausgelöster Arterienkrampf, der Anurie zur Folge hat.

*Traube* erklärte die eklamptischen Anfälle dadurch, dass bei der durch Eiweissverlust hervorgerufenen Hydraemie die gleichzeitige Hypertrophie des linken Ventrikels eine solche Drucksteigerung im arteriellen System hervorrufe, dass bei dem wässrigen Blute, Gehirnoedem eintrete und dieses Oedem habe seinerseits wieder Gehirnanaemie mit ihrem Symptomen (Coma und Convulsionen) im Gefolge. Von *Rosenstein* wurde diese Theorie in dem Sinne verwertet, dass man gerade bei Schwängern selbst ohne Nierenerkrankungen Hydraemie und Hypertrophie und während der Wehen auch Drucksteigerung im arteriellen System finde.

*Stumpf* zeigte aber, dass der Druck in den Arterien bei Eklampsie keineswegs immer erhöht, sondern vielmehr erniedrigt ist; ferner fanden *Löhlein* und *Olshausen* das Hirnoedem bei Sektionen nicht regelmässig. *Schroeder* sah die Ursache der Eklampsie in einer akuten Gehirnanaemie, die infolge eines Gefässkrampfes auftritt. *Dührssen* hielt die Eklampsie für eine Intoxikation durch zurückgehaltene Urinbestandteile besonders Kreatin und Kreatinin, welche sich in der Hirnrinde ablagern und Krämpfe verursachen.

*Halbertsma* und *Hiller* führten die Urinretention und damit die Eklampsie auf die Kompression der Ureteren oberhalb des Beckeneingangs zurück, die durch den Druck des graviden Uterus herbeigeführt wird. Die dadurch bedingte pralle Spannung des Nierenbeckens soll besonders leicht zum Ausbruch der Krämpfe führen können. Die erhobenen Sektionsbefunde aber waren nicht derart, um diese Theorie zu stützen.

Während die angeführten Theorien das Wesen der Eklampsie auf eine Vergiftung des Blutes mit Harnbestandteilen zurückführten, stellte eine andere Reihe von Theorien sie auf rein nervöse Momente ab und bezichtete die Nierenerkrankung als Gelegenheitsursache. So suchte *Osthoff* die Eklampsie durch eine ungewöhnliche Innervation des Plexus splanchnicus zu erklären, die von den Bewegungen des Uterus ausgeht und auf die Vasoconstrictoren der Nieren und des Zentralnervensystemes einwirke. *Schaefer* wollte die Eklampsie auf eine Lähmung des Plexus coeliacus zurückführen. Als Ursache der Lähmung nimmt er Ptomainintoxikation infolge der Invasion von Bakterien an.

Von *Herff* wiess darauf hin, dass die Krämpfe bei Eklampsie, Uraemie und Epilepsie an sich keine wesentliche Verschiedenheit bieten. Damit sie zustande kommen, be-

darf es einer eklamptischen Labilität der Grosshirnrinde auf Grund einer neuropatischen Belastung, welche sowohl angeboren, als erworben sein kann. Erworben kann diese eklamptische Labilität werden durch Intoxikation, Infektion oder durch den physiologischen Gestationsreiz, namentlich bei Erstgebärenden. In letzter Linie beruht diese Theorie auf eine Vergiftung des Körpers und darum könnte der Anfall rein nervöser Natur sein.

*Zangenmeister* nahm diese Theorie auf dem Kongresse deutscher Naturforscher in Karlsruhe wieder auf; es fallen aber die Nieren- und Leberveränderungen schwer ins Gewicht, wie sich *Prof. von Herff* selber in der Diskussion ausdrückt.

*Albert* wollte die Eklampsie als eine Intoxikation erklären, welche durch Stoffwechselprodukte von Mikroben der Decidua verursacht ist. Die Eklampsie beruhe also auf einer latenten Mikrobenendometritis in der Schwangerschaft und zwar desswegen in der Schwangerschaft, weil vom sechsten Monate an die Mikroben des Fundus uteri sicherlich durch Verklebung der Reflexa mit der Vera vollkommen gegen die Aussenwelt abgeschlossen sind und dadurch eine Intoxikation Zustande kommen kann. Diese Intoxikation soll auch die Nephritis verursachen. Es ist aber dabei kein bestimmter Erreger zu beschuldigen.

*Müller* gab eine ähnliche Erklärung, jedoch mit dem Unterschied, dass sich nach *Albert* die Mikroben auf lebensfähigem Decidualgewebe etablieren, während nach *Müller* auf mortifiziertem Gewebe placentaldecidualen Ursprungs.

Nur wenige Autoren haben eine spezifische bakterielle Infektion als Ursache der Eklampsie anzunehmen und diese Annahme durch Tierexperimente zu stützen versucht. Der erste, der im Harne von Schwängern kurze Kettenkokken fand, war *Doleris*. An Versuchstieren wollte er durch Injektion von Kulturen in die Blutbahn der Eklampsie ähnliche Erscheinungen hervorgebracht haben. *Favre* züchtete aus den weissen Infarcten der Placenta einer Eklamptischen einen *Mikrococcus eklampsiae*.

Auch *Gerdes* beschrieb aus der Halle'schen Klinik unter *Fehling* einen *Bazillus eklampsiae*, aber die Nachuntersuchungen von *Hofmeister*, *Haegler* und *Döderlein* wiesen nach, dass es sich um *Proteus vulgaris* handelte.

Die letzten Jahre haben die Lehre von der Intoxikation durch Urin in modernem Gewande wiedergebracht. Anfangs

der 90er Jahre kam die Theorie der Autointoxikation auf, die von *Bouchard*, besonders für die Uraemie aufgestellt, von *Rivière* und andern für die Eklampsie weiter ausgebaut wurde. Hiernach war die Eklampsie eine Autointoxikation durch eine gewisse Substanz hervorgerufen, welche sich während der Schwangerschaft im Kreislauf sammelt und deren Anwesenheit sich durch vermehrten Toxingehalt im Blute und einen verminderten Urin nachweisen liesse. Die Eklampsie mit Albuminurie erklärte dieser Autor durch Nierenerkrankungen, die ohne Albuminurie durch die relative Insuffizienz der Nieren, immer aber bei gleichzeitiger anderer wichtiger Ausscheidungs-Organen (Leber, Haut, Darm etc.)

*Ludwig* und *Savor* haben im allgemeinen dieselben Resultate erzielt und als neue Stütze der Autointoxikationstheorie, die Beobachtung hinzugefügt, dass der nach Ablauf der Eklampsie ausgeschiedene Urin einen besonders hohen Grad von Toxicität zeige. Die Ursache der eklamptischen Autointoxikation müsse also in der Retention einer harnfähigen Substanz zu suchen sein. Als dieser Körper wird von *Ludwig* und *Savor* die Carbaminsäure angesprochen.

Zu den gleichen Resultaten führten die Untersuchungen von *Hahn* und *Massen*, *Nencki* und *Pawloff* über die Rolle der Leber im intermediären Stoffwechsel. In neuerer Zeit haben *Volhard* und *Schuhmacher* diese Theorie angegriffen, indem sie zeigten, dass Serum Eklamptischer nicht giftiger sei als normales, wenn man Tieren intravenös injizierte. Auch für Harn wurde von *Schuhmacher* dasselbe Resultat erzielt.

*Ahlfeld* nahm auch eine Intoxikation an. Dieses Gift rühre sehr wahrscheinlich von Zerfallsprodukten, die bei jeder Schwangerschaft im Uebergangsstadium zu finden seien, die aber normalerweise sich im mütterlichen Körper nicht anhäuften, sondern ohne irgend welche Erscheinungen zu machen, durch die Nieren ausgeschieden würden. Darnach würde nicht das Gift in erster Linie und allein für die Entstehung der Eklampsie verantwortlich zu machen sein, sondern die Funktionsstörung der Nieren, teils physiologischer, teils pathologischer Art.

*Winkler* drückt sich in ähnlicher Weise aus, indem er sagte, dass die Krämpfe durch Stoffwechselprodukte hervorgerufen, durch eine Lähmung oder gänzliche Aufhebung der sekretorischen Funktion der Nieren bedingt seien.

Die jetzt allgemein anerkannte Theorie ist die Vergiftungstheorie, die auch wirklich fast ausnahmslos alle Fälle von Eklampsie zu erklären scheint. Der in so mancher Hinsicht von normalem Verhalten abweichende Zustand einer jeden Schwangern lässt uns annehmen, dass die Gravidität, wenn sie auch einen natürlichen Vorgang darstellt, gewisse mechanische Veränderungen im Körper schafft, die vielleicht im Verein mit noch andern prädisponierenden Momenten den Symptomenkomplex der Eklampsie auslösen kann.

Man kann wohl behaupten, dass bei jeder Schwangerschaft es zu einer Intoxikation im mehr oder weniger grossen Masse kommt; dafür spricht der von normalem ganz beträchtlich abweichenden Zustand der Schwangern; das Erbrechen, Psychosen, vorübergehende Amaurose, die Konvulsionen selbst, die Art und das plötzliche Auftreten der Nierenerkrankung und ihr meist schnelles Verschwinden nach Aufhören der Anfälle. Gerade die Tatsache, dass es meist nicht zu einer Anhäufung der Giftstoffe, sondern dass im allgemeinen der Organismus die Fähigkeit besitzt sie zu eliminieren, spricht dafür, dass noch andere Momente hinzutreten müssen, damit grössere Giftansammlung zustande kommt und als Folge davon der Symptomenkomplex der Eklampsie hervorgerufen wird. Für eine Vergiftung sprechen vor allem auch die anatomischen Befunde, welche durch die zahlreichen genauen Untersuchungen der an Eklampsie Verstorbenen gewonnen wurden. Man findet an den Organen Veränderungen, als ob der ganze Organismus durch intensives Gift geschädigt worden wäre.

Ueber die Art des Giftes und über seine Provenienz ist eine grosse Anzahl von Hypothesen aufgestellt worden, von denen jedoch keine eine derartige befriedigende Erklärung zu geben vermochte, um allgemeine Anerkennung zu finden. Von diesen sind zwei besonders wichtig:

Nach der einen Theorie soll die Ursache der Eklampsie auf Stoffwechselprodukten des Foetus beruhen, sofern der mütterliche Organismus nicht im Stande sei, die vermehrte Arbeit, die erforderlich ist, um die Excretionsprodukte des Foetus plus den eigenen herauszuschaffen. Diese Giftstoffe häufen sich im Kreislaufe an und die, gegebenen Falles, organische Veränderungen hervorbringen, die ihrerseits Eklampsie bedingen. Besonders *Fehling* trat für diese Theorie auf dem Gynäkologen-Kongress im Jahre 1901 und zwar aus folgenden Gründen:

- 1) Weil sie äusserst selten ist in den ersten Schwangerschaftsmonaten.
- 2) Weil sie häufig ist bei Zwillingen.
- 3) Weil sie verschwindet nach Absterben des Foetus.
- 4) Weil sie häufiger ist in der Schwangerschaft als unter der Geburt.
- 5) Weil sie aufhört durch rasche Entbindung.

Wie sollten sich aber jene Fälle von Eklampsie erklären, die erst mehrere Tage nach der Geburt auftreten ?

Ferner beschrieb *Meyer-Wirz* einen Fall, bei dem das Kind im hochgradig macerierten Zustand geboren, und die Patientin schon vor Ausbruch ihrer Erkrankung mit Bestimmtheit angegeben hatte, dass sie seit drei Wochen absolut keine Kindsbewegung mehr gefühlt habe. Auch in meinem Material finden sich solche Fälle, die nicht geeignet wären, dieser Theorie zum Beweise zu dienen.

Die zweite jetzt verbreitetste Theorie ist die Placentartheorie, deren eifrigster Forscher und Vorkämpfer *Lippmann* ist, welcher seine geistreichen und hochinteressanten Arbeiten in zahlreichen Versuchsreihen durchgeführt und seine Theorie weitgehendst gestützt zu haben glaubte. Die Resultate lassen sich kurz folgendermassen zusammenfassen: In der Eklampsieplacenta findet sich ein Gift, welches sich in der normalen Placenta nicht findet. Dieses Gift zeigt eine ausgesprochene Affinität zu den Gehirnzellen, die durch dasselbe gelähmt werden. Ausserdem ruft das Gift in erster Linie eine Schädigung des Nieren- und Leberparenchyms. Die Nierenschädigung ist stets sekundäre Folge der Vergiftung; bei schon bestehender Eiweissausscheidung kann diese durch dieses Gift bedeutend gesteigert werden. Die Entstehung der Eklampsie im Wochenbett wird dadurch erklärt, dass in diesen Fällen die Leber imstande ist, zunächst die Gesamtmenge des Toxins zu retinieren, aber nicht imstande ist, sie zu neutralisieren. Im Verlauf des Wochenbettes treten nun diese nicht neutralisierten Toxinmengen in den mütterlichen Organismus über; finden sie einen günstigen Boden, sowohl im Gehirn wie in den Nieren, so tritt das typische Bild der Eklampsie mit Krämpfen und Albuminurie auf.

Eine weitere Theorie zur Erklärung der Eklampsie wurde vom italienischen Gelehrten *Vasalle* aufgestellt. Er führte den Ausbruch der Eklampsie auf pathologische Veränderungen der Epithelkörperchen zurück, denn er fand

bei Sektionen Eklamtischer entweder Fehlen eines oder mehrerer Epithelkörperchen, oder sonstige pathologische Veränderungen. Die allerneueste und in meinen Augen auch die waghaltigste in Bezug auf ihre therapeutischen Folgen scheint mir die von *Sellheim* aufgestellte Theorie der Eklampsie, die besonders zur Erklärung der Eklampsie im Wochenbett dienen soll. Ausgehend von der Betrachtung, dass trotz Entfernung der vermeintlichen Giftquellen (Foetus und Placenta) die Anfälle fort dauern und heftiger werden, will er aus einer andern charakteristischen puerperalen Erscheinung die Giftproduktion herleiten. Als solche bezeichnet er die Laktation, denn dabei findet eine völlige Umkehr der Stoffwanderung von der Placenta zur Brust. Alle die Veränderungen, die dabei in der Mamma bei der Laktation vor sich gehen, weisen auf die Quelle des problematischen Giftes hin. Er zog die von Tierärzten schon lange gemachte Beobachtung, dass die Eklampsie der Kuh durch Jodkaliuminjektion in den Euter gebessert werde, zur Stütze seiner Theorie heran, und wandte selber in einem desperaten Falle dieselbe Therapie bei einer Frau an, wo die andern therapeutischen Eingriffe nutzlos waren und erzielte eine bedeutende Besserung. Dadurch glaubte er seine Theorie für begründet und entschloss sich in einem Falle, wo alles versagte, zu subkutanen Ausschälung beider Mammae und zwar mit positivem Erfolge.

Diese kurze, theoretische Erörterung zeigt uns zur Genüge, dass das Wesen der Eklampsie noch immer ein Rätsel ist, so dass noch immer mit Recht der Satz von *Zweifel*, dass die Eklampsie die Erkrankung der Theorien ist, zu recht besteht.

Ich will nun kurz das Basler Material von 1901—1910 tabellarisch vorführen, um die wichtigsten Momente derselben hervorzuheben.

**1901**

| No und Datum          | Alter Para | 5 | P. | p. p. | Total | Urin                                                 | Entbindung                                                                                              | Medicamentöse Therapie                                                                                                                                             | Zustand der Mutter                                                                                                                                            | Zustand des Kindes                                             | Bemerkungen                                                            |
|-----------------------|------------|---|----|-------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>210<br>25. II.   | 29<br>I    | 9 |    | 3     | 12    | Gerinnt beim Kochen                                  | Sectio caesarea                                                                                         | Wegen schlechtem Puls Kochsalzinfusion                                                                                                                             | ✱ Path. Diagnose: Eklampsie gravidarum: Nephritis parenchymatosa. Blutung in Lungenlebergewebe, Schleife Pneumonie d. rech. Interlappens Milzinmet. Pneumien. | Lebend, unreif VIII. M.                                        | Patientin wird im Coma eingeliefert                                    |
| 2<br>272<br>16. III.  | 35<br>III  |   | 2  |       |       | Anfangs 1 $\frac{1}{2}$ ‰ Ei. nach 8 Tagen kein mehr | Spontan                                                                                                 | Nach dem ersten Anfall 0,01 Mō. Heisse Umschläge. Flidertee. Nach dem zweiten Anfall 0,005 Mō                                                                      | Nach 14 Tagen geheilt entlassen                                                                                                                               | Kind gesund                                                    | Erster Anfall 14 Stund. nach der Geburt                                |
| 3<br>387<br>19. IV.   | 20<br>I    |   | 6  |       | 6     | 8 $\frac{1}{2}$ ‰ Eiweiss                            | Expression d. toten Kindes                                                                              | Kochsalzinfusion Campher                                                                                                                                           | ✱ nach Eintritt in die Klinik keine Pathog. Diagnose                                                                                                          | Totgeboren Mitte IX. M.                                        | Patientin wird im Coma eingeliefert                                    |
| 4<br>668<br>3. VIII.  | 39<br>V    | 9 |    |       | 9     | Viel Albumen, nach 14 Tagen verschwunden             | Nach Einlegen des Metreuryters in Chloroformarkose erfolgt nach 2 Std. spontane Geburt                  | 3,0gr Dormiol p. clysmā Heisser Wickel später 5,0 gr Dormiol p. clysmā Mō subcutan                                                                                 | Nach 21 Tagen geheilt entlassen                                                                                                                               | Kind im VIII. M. kommt asphyktisch zur Welt. Gesund entlassen  | Nach den Anfällen wiederholt comatöser Zustand, der 10-40 Min. dauerte |
| 5<br>788<br>17. IX.   | 38<br>I    |   | 1  |       | 1     | 1 $\frac{1}{2}$ ‰ Alb, nach 12 Tagen verschwunden    | Schnellentbindung Radiäre Incisionen Forceps                                                            | Phoenix : 3 gr Dormiol per clysmā Heisse Wickel                                                                                                                    | Nach 9 Tagen geheilt entlassen                                                                                                                                | Kommt etwas asphyktisch zur Welt, sonst reif. Gesund entlassen | Einlieferung in die Klinik in tiefem Coma                              |
| 6<br>1006<br>17. XII. | 36<br>VI   | 9 |    |       | 9     | Urin gerinnt beim Kochen zur Hälfte                  | Künstlicher Blasenschnitt dann nach 2 Stunden Perforation und Extraction des Kindes in Chloroformarkose | Nach dem ersten Anfall 3 gr Dormiol p. clysmā. Nach der Extraction Ergotin wegen leichter Blutung Wegen schlechtem Pulse Campher u. Strichm 0,002 Kochsalzinfusion | ✱ Keine path. Diagnose                                                                                                                                        | Perforiert                                                     | Einlieferung im somnolenten Zustand                                    |

1902

| No und Datum          | Alter Para | 5 | P. | P. d. | Total | Urin                                                                                                     | Entbindung                                                        | Medicamentöse Therapie                                                      | Zustand der Mutter              | Zustand des Kindes                                  | Bemerkungen                                                                    |
|-----------------------|------------|---|----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>38<br>4. I.      | 20<br>I    | 1 | 1  |       |       | Anfangs nur mit Katheter zu lösen. 9 <sup>o</sup> / <sub>100</sub> Albinen. Nach 10 Tagen verschw.       | Frühentbg. durch Forceps nach dem ersten Anfall                   | Keine                                                                       | Nach 14 Tagen geheilt entlassen | Reif, tot                                           | Nach dem Anfall tiefes Coma                                                    |
| 8<br>47<br>7. I.      | 22<br>I    | 8 | 1  |       |       | 11 <sup>o</sup> / <sub>100</sub> Eiwei. Urin muss m. Kathet. geleitet werden. Nach 10 Tagen verschwunden | Nach dem 8. Anfälle Perforation u. Extraction                     | Phoenix Kochsalzinfusion. Heisses Bad u. heisse Einpackungen Milchdiät      | Nach 14 Tagen geheilt entlassen | Perforiert im VII. Monat                            | Einlieferung im Coma                                                           |
| 9<br>461<br>7 VI.     | 34<br>I    | 1 | 1  |       |       | 1 1/2 <sup>o</sup> / <sub>100</sub> Eiweiss                                                              | Nach dem 1. Anfall Forceps nach multiplen Incisionen              |                                                                             | Nach 15 Tagen geheilt entlassen | Kind gesund entlassen mit leichter Facialis paresis |                                                                                |
| 10<br>470<br>4. VI.   | 26<br>I    | 1 | 1  |       |       | 12 <sup>o</sup> / <sub>100</sub> Eiweiss Nach 7 Tagen verschwunden                                       | Spontan                                                           | Nach dem 1. Anfall 0.01 Mo. Heisse Wickel Phoenix Milchdiät                 | Nach 12 Tagen geheilt entlassen | Totgeboren                                          | In den letzten 14 Tagen der Schwangerschaft Öedeme, früher Urin, Kopfschmerzen |
| 11<br>578<br>6. VII.  | 27<br>I    | 1 | 1  |       |       | 2 <sup>o</sup> / <sub>100</sub> Eiweiss                                                                  | Nach dem Anfall Perforation und Extraction des schon toten Kindes | 3.0 gr Dermiol nach dem 1. Anfall                                           | Nach 12 Tagen geheilt entlassen | Perforiert                                          |                                                                                |
| 12<br>599<br>23. VII. | 38<br>I    | 3 |    |       |       | 2 <sup>o</sup> / <sub>100</sub> Eiweiss                                                                  | Spontangeburt                                                     | Heisses Bad, Wickel Phoenix Wildunger-Salz                                  | Nach 30 Tagen geheilt entlassen | Maceriert im VII. Monat                             |                                                                                |
| 13<br>694             | 36<br>V    | 3 |    |       |       | 2 <sup>o</sup> / <sub>100</sub> Eiweiss                                                                  | Patientin wird unentbunden entlassen                              | Nach dem 1. Anfall Mo. sube. In der Klinik Diaphoresis u. Milchdiät Phoenix | Unentbunden entlassen           | Kind lebt bei der Entlassung                        | In der Schwangerschaft geschwollene Beine Kopfschmerzen                        |

1903

| No und Datum         | Alter Para | P. | d. | Tag | Urin                                                                                                                    | Entbindung                                                                                 | Medicamentöse Therapie                                                                                                                                                                                                                          | Zustand der Mutter                                 | Zustand des Kindes | Bemerkungen                                                                                     |
|----------------------|------------|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14<br>343<br>11. IV. | 26<br>I    | 5  |    |     | 2% <sub>00</sub> Eiweiss stieg in den erst. 3 Tagen bis auf 56 % <sub>00</sub> . Bei der Entlassung kein Albumen mehr   | Eihautstich spontan                                                                        | Nach Eintritt in die Klinik Dormiol 4 gr per clysm. Wickel, Mō 0,015 subcutan. Phœnix. Nach der Geburt wieder Dormiol per clysm.                                                                                                                | Mutter nach 28 Tagen geheilt entlassen             | Gesund im VIII. M. |                                                                                                 |
| 15<br>493<br>27. V.  | 27<br>V    | 16 |    |     | Anfangs 12 % <sub>00</sub> am 2. Tage 8 % <sub>00</sub> Eiweiss, am 3. Tag 11 % <sub>00</sub> , am 5. kein Eiweiss mehr | Spontan                                                                                    | Auf der med. Klin. bekam sie Mō 0,03 u. Chloral 3,0 gr u. etwas Chloroform währ. eines starken Anf. N. Eintr. in die Klinik Dormiol 3 gr. Nach einem weitem Anfall wieder Dormiol 6 gr per clysm. Nach der Geburt weg. Unruhe Mō 0,015. Phœnix. | Mutter nach 17 Tagen geheilt entlassen Eiweissfrei | Maceriert          | Eintritt in die Klinik im benommenen Zustand                                                    |
| 16<br>915<br>17. X.  | 21<br>I    | 10 | 5  | 15  | Urin Katheterisiert 7% <sub>00</sub> Eiweiss                                                                            | <b>Schnellentbindung</b><br>Multiple Incisionen, dann Forceps und zwar nach dem 10. Anfall | Sof. nach Eintritt in die Klinik 4 gr Dormiol in Milch. Dunkelzimmer. Nach 1 Std. wieder 2 gr Dormiol, dann Mō 0,015 subcutan, Dormiol 4 gr Mō 0,01, Kochsalzlösung. Phœnix. Milch. Vichy.                                                      | Mutter nach 16 Tagen geheilt entlassen             | Lebend und reif    | Bei Eintritt starke Aufregung Wochenbett normal                                                 |
| 17<br>925<br>19. X.  | 26<br>I    | 2  |    |     | Anfangs 9% <sub>00</sub> Eiweiss in den letzten 10 Tagen alles Albumen verschwunden                                     | Zu Hause spontane Geburt                                                                   | Nach dem 1. Anfall 0,01 Mō dem Transport in die Klinik hier, 2. Anfall darauf sofort 4,0 gr Dormiol Milch Dunkelzimmer. Phœnix.                                                                                                                 | Nach 23 Tagen entlassen                            | ?                  | In den letzten Monaten der Schwangerschaft Oedeme. Einige Stunden nach der Geburt erster Anfall |

1904

| No und Datum         | Alter Para | G. | P. | d. | Teil | Urin                                        | Entbindung                                                            | Medicamentöse Therapie                                                                                                                           | Zustand der Mutter                                                              | Zustand des Kindes               | Bemerkungen                                                                                                     |
|----------------------|------------|----|----|----|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18<br>6<br>12. XII.  | 37<br>I    |    | 1  | 2  | 3    | Anfangs 6 ‰ Eiweiss                         | Forceps und zwar nach dem ersten Anfall                               | Nach der Geburt 2,0 gr Dormiol per clysm., nach 2 Std. wieder Dormiol. Dunkelzimmer Mō 0,01. Nach dem 2. Anfall Wickel, nach dem 3. Dormiol 3 gr | Nach 25 Tagen geheilt entlassen                                                 | Totgeboren                       | Bei der Untersuchung kindliche Herzöne schwach. Einlieferung in die Klinik im aufgeregt soporösen Zustand       |
| 19<br>16<br>21. XII. | 21<br>I    | 9  |    |    |      | Anfangs 3 ‰ Eiweiss                         | Beckenausgangs Zange                                                  | Nach Eintritt sofort 3,0 gr Dormiol. Nach 2 Std. wieder 2,0 gr Dormiol, darauf ruhiges Verhalt. Mō 0,01. Milchdiät. Schwitzkur                   | Nach 30 Tagen geheilt entlassen                                                 | Kind lebend asphiktisch IX. M. ✕ | Einlieferung in soporösen Zustand Zu Hause hatte sie 9 Anfälle                                                  |
| 20<br>74<br>?        | 28<br>I    |    | 5  | 2  | 7    | ?                                           | Aeusserer Wendung auf den Kopf Blasenstich. Multiple Incisionen Zange | 3,0 gr Dormiol per Milchclysma. Wickel. Dunkelzimmer. Dormiol und Wickel wiederholt. Wegen schlecht. Puls. Campher Coffein                       | ✕<br>Parenchymatöse und fettige Degeneration der Epithelien und Nierenkanälchen | ✕<br>unreif                      | Zu Hause 3 Anfälle Befund: Querlage Nach dem 7. Anfall frequenter kaum zu fühlender Puls. Respiration stertorös |
| 21<br>58<br>3. VI.   | 21<br>II   |    | 5  |    | 5    | 20 ‰ Eiweiss nach 6 Tagen kein Eiweiss mehr | Spontan                                                               | Dormiol per clysm. 4gr Heisse Wickel. Nach der Geburt 4,0 gr Dormiol per clysm. Kochsalzinfusion. Wickel. Phoenix. Milch. Vichy                  | Nach 17 Tagen geheilt entlassen                                                 | Totgeboren im VII. Monat         | Eintritt in die Klinik im bewusstlosen Zustand                                                                  |

|                       |          |          |                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22<br>619<br>19. VI.  | 37<br>VI | 15 11 26 | Urin gerinnt<br>beim Kochen | Extraction                                                        | M 6 0,01. Dormiol 4 gr<br>per clysm. Dunkel-<br>zimmer. Wickel. Dor-<br>miol 2 gr. Kochsalzinf-<br>subcutan. Wickel. Dor-<br>miol. Campher. Coffein-<br>injektion<br>wegen schlechtem Puls | ✱<br>Patholog. Diagnose:<br>Nephritis parenchymat.<br>Necros et haemorrhagia<br>hepatis. Degeneratio-<br>cordis et necrosis<br>myocardii. Oedeme<br>pulmonum. Aetia ne-<br>crotica. Haemorrhagia<br>Ventriculi | Faultot im<br>VII. M. | Schon bei einer frühern<br>Schwangersch. v. 2 Jahr.<br>eklampt. Anfälle. Seit-<br>her Eiw. im Urin. Seit<br>2 Mon. Eiw. u. Oedeme<br>zunehmend. In den letz-<br>ten 3 Wochen Milchdiät.<br>Zu Hause 10 Anf. Auf<br>dem Transport d. elfte.<br>Seit dem 5. Anfalle ist<br>Patientin bewusstlos. |
| 23<br>693<br>10. VII. | 27<br>I  | 3        | 70/100 Eiweiss              | Spontangeburt                                                     | 3 gr Dormiol per<br>clysma. Heisse Wickel.<br>Thyreoidintablett, ver-<br>schiedene mal verab-<br>reicht, wegen kleinem<br>Puls. Infus. Digitalis<br>Coffein, Campher                       | ✱<br>am 11. Tag<br>Patholog. Diagnose:<br>Pneumonia et gangrena<br>pulmonum sinistra<br>Pleuritis et pericarditis<br>purulenta. Peritonitis<br>Nephritis parenchyma-<br>tosa                                   | Tot im VIII. M.       | Während der Krank-<br>heit brach eine Piel-<br>ropneumonie aus                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24<br>1089<br>4. X.   | 22<br>I  | 4 4      | 6°/100 Eiweiss              | Spontan                                                           | Dormiol 3,0 gr p. clysm<br>wiedeholt.<br>Heisse Wickel<br>Kochsalzclysm                                                                                                                    | Am 6. Tage Verlegung<br>in die psychiatrische<br>Klinik wegen Psychose                                                                                                                                         | Lebend reif           | Eintritt in die Klinik<br>in bewusstlosem Zu-<br>stand. Aufregung                                                                                                                                                                                                                              |
| 25<br>1145<br>18. XI. | 18<br>I  | 4 1 5    | 1°/100 Eiweiss              | Sprengen der Blase.<br>Multiple Incisionen<br>des Cervix. Forceps | Schon zu Hause Chloro-<br>formnarkose, welche in<br>der Klinik fortgesetzt<br>wird, dann Dormiol 6 gr<br>per clysm<br>Heisse Wickel<br>Dormiol verschiedene<br>mal per clysm gegeben.      | Nach 20 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                                                                                                             | Lebend reif           | Zu Hause 4 Anfälle<br>Sehstörungen<br>Wochenbett zu Anfang<br>febril                                                                                                                                                                                                                           |

1905

| No und Datum          | Alter Para | G | P. | d. | Total | Urin                                                                                             | Entbindung                                      | Medicamentöse Therapie                                                                                                                                                                           | Zustand der Mutter                                                                                                                                                                   | Zustand des Kindes           | Bemerkungen                                                                                             |
|-----------------------|------------|---|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26<br>94<br>13. I.    | 28<br>I    | 1 | 1  |    |       | Reichl. Eiw. Pat. musste lange Katheteris. werden. Urin dunkel. Nach 3 Tagen kein Bluthoch mehr. | Blasensprung Forceps                            | 6 gr Dorniol per clysmata und heisser Vollwidel, Coffein u Campher weg, schlechtem Puls                                                                                                          | Nach 35 Tagen geheilt entlassen                                                                                                                                                      | Totgeboren unreif            | Einfrierung, im bewussten Zustand                                                                       |
| 27<br>109<br>18. I.   | 32<br>IV   | 6 | 6  |    |       | Anf. 4 % Eiw. Verschw. in den ersten 5 Tagen                                                     | Nach künstl. Blasensprung Beckenausgangs Zange  | 6 gr Dorniol p. rectum 500 cem Kochsalzlösung. Heisser Vollwidel                                                                                                                                 | Nach 12 Tagen geheilt entlassen                                                                                                                                                      | Lebend im VIII. Mon.         | Einfrierung in bewussten Zustand                                                                        |
| 28<br>949             | 31<br>I    | 3 | 3  |    |       | 4% Eiw. Bei der Entlassung noch 2% noch                                                          | Spontangeburt                                   | Weg. schl. Puls Öl. emphoratur; dann Dorniol p.d. heisse Einpack. Isol. Phenix. Wegen schl. Puls wird Coffein. Milchdiät.                                                                        | Mutter nach 21 Tagen entlassen mit 2% Eiw. keine pathog. Diagnose                                                                                                                    | Totgeboren                   | Oedeme an den Beinen die nach einigen Tagen verschwinden                                                |
| 29<br>995<br>7. IX.   | 34<br>IV   | 7 | 7  |    |       | 2% Eiw. Weiss                                                                                    | Spontan                                         | Weg. Kopfstein. Aspirin. Pyramidon Eish. auf den Kopf ohne Erfolg. Mo 0.11. scharf Schlaf herb. Dorniol 6 gr p.d. heisse Einpack. Ven. sekt. n. d. 4. Auf. Kochsalzlösung. Sauerstoff inhalation | ✕                                                                                                                                                                                    | Lebend und gesund            | Unmittelb. p. partum heftige Kopfschmerzen. 1. Anfall 6 Std. nach der Geburt. Nach dem 3. Anfall Coma   |
| 30<br>1003<br>9. IX.  | 23<br>I    | 8 | 8  |    |       | 2% Eiw. Weiss                                                                                    | Schnellentbindung durch vaginalen Kaiserschnitt | Dorniol p. clysmata 6 gr Milch u. Vichydarreich. Oleum camphorat Schwitzbett                                                                                                                     | Nach 27 Tagen geheilt entlassen                                                                                                                                                      | Lebend                       | Nephritis in der 2. Hälfte der Schwangerschaft. 6 Anfälle schon zu Hause 1 auf dem Transport            |
| 31<br>1048<br>28. IX. | 27<br>I    | 5 | 5  | 1  | 6     | 8% opalescierend bis zum 7. Tag                                                                  | Schnellentbindung Multiple Incisionen. Forceps  | Nach dem 3. Anfall Mo 0.01 subc. dann Dorniol heisse Wickel, Dunkelz. Milch u. Vichy. Phenix à air chaud                                                                                         | Nach 12 Tagen geheilt entlassen                                                                                                                                                      | Kind anfangs asphixisch lebt | 4 Anfälle zu Hause 1 auf dem Transport                                                                  |
| 32<br>1332            | 43<br>V    |   |    | 4  | 4     | 5% Eiw. Weiss                                                                                    | Spontans Zwillingsgeburt                        | Warme feuchte Einpackungen. Nach dem 4. Anfall Dorniol. Coffein, Campher weg. schlechtem Puls, Kochsalzinfusion Venae-sektion                                                                    | ✕ Patholog. Diagnose: Blutung und Ektase. Nekrosen in der Leber. Leichte Trübung in der Nierenrinde. Kleine Blutungen im Epi u. Endocard Oedeme in den beiden Unterlappen der Lungen | ?                            | Zu Hause 3 Anfälle nach der Geburt. Einfrierung in bewussten Zustand. Nach Lungeneodem. Trachealrasseln |

**1906**

| No und Datum          | Alter Para | G. | P. | d. | Total | Urin                                                            | Entbindung                                                                       | Medicamentöse Therapie                                                                                                                                                                                                                              | Zustand der Mutter                                                                                                                                                                                               | Zustand des Kindes | Bemerkungen                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------|----|----|----|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33<br>82<br>11. I.    | 39<br>II   |    | 1  |    | 1     | 8 <sup>1</sup> / <sub>100</sub> Eiweiss                         | Nach dem ersten Anfall Forceps                                                   | Dormiol, 100 mg 5-6 gr in kurzen Zwischenräumen. Heisse Wickel. Dunkelzimmer                                                                                                                                                                        | Nach 11 Tagen geheilt entlassen                                                                                                                                                                                  | Gesund             | Im Wochenbett 2mal Fieber                                                                                                                                      |
| 34<br>267<br>5. III.  | 19<br>I    |    | 7  |    | 7     | 6 <sup>1</sup> / <sub>100</sub> Eiweiss<br>in 5 Tg. keines mehr | Spontan                                                                          | Nach 4.2 Anf. Mo 0.015, dann 100 mg 10. Heisse Wickel. Nach 10. Tg. 100 mg 10. Chlorof. darauf 100 mg 10. Spermin 0.005, Mo 0.015 Spermin 0.02                                                                                                      | Nach 10 Tagen geheilt entlassen                                                                                                                                                                                  | Gesund             | Nach jedem Anfall manische Aufregung                                                                                                                           |
| 35<br>358<br>24. III. | 25<br>I    |    | 4  |    | 21    | 15 <sup>1</sup> / <sub>100</sub> Eiw. Nach 8 Tagen noch 7/4 e/g | Spontan                                                                          | Abw. Spermin 1.0u Scopulamin 0.0005 u. zwar mehrmals. Milchdiät Spermin. 0.0005 Scopulamin u. zwar mehrmals. Milchdiät. Vichy. Schokolade. p. Cochin. Wegen Atemnot 60 mg Mo 60. Eishlase. darauf etwas Beruhig. Venaesekt. Digitalen, Coffein etc. | Mutter nach 14 Tagen geheilt entlassen                                                                                                                                                                           | Gesund             | Bim. im bawussl. Zustand und temper. sich währd. d. Anf. bis 40.7° ordnetbett febril                                                                           |
| 36<br>794<br>16. VII  | 32<br>I    |    | 1  |    | 5     | Stark getrübt 500 ccm <sup>3</sup> Harn                         | Blasensprung<br>Einlegen von Far-<br>mischen Ecarteur<br>dann spontane<br>Geburt | 2.5 Spermin subcutan<br>2.5 gr Dormiol p. clysmia<br>Wickel                                                                                                                                                                                         | keine Diagnose                                                                                                                                                                                                   | Tot                | Zu Hause eklampsi-seh. Anfall. Nephritis. Vitium cortis                                                                                                        |
| 37<br>877<br>30. VII. | 34<br>III  |    | 14 |    | 14    | Wenig Eiweiss                                                   | Spontan                                                                          | 2.5 Spermin subcutan<br>2.5 gr Dormiol p. clysmia<br>Wickel                                                                                                                                                                                         | Psychose                                                                                                                                                                                                         | ?                  | Erst am 7. Tag d. Wochen-<br>betts. Krampfanfall am<br>10. Tage. mäßig 12 bei<br>ständiger Bewusstlosigk.<br>Beim Eintritt in die Klinik<br>Sensorium benommen |
| 38<br>887<br>1. VIII. | 26<br>I    |    | 5  |    | 5     | 10 <sup>1</sup> / <sub>100</sub> Eiweiss                        | Spontan                                                                          | Chloroformmark. beim 5.<br>Anf. 100 mg 10. Tg. 100 mg<br>Milch. Viehwasser. Schwa-<br>im Phoenix. Weg. Kopf-<br>schmerzen Antipyrin.<br>Digitalis Ergotin                                                                                           | Nach 23 Tagen geheilt entlassen                                                                                                                                                                                  | Tot                | Zu Hause 4 Anf. nach<br>d. Geburt. Beim Eintritt<br>1 Anf. Oedeme vorh.,<br>die durch Schwitzen<br>abnehmen                                                    |
| 39<br>1179<br>28. X.  | 25<br>I    |    | 14 |    | 14    | 5 <sup>1</sup> / <sub>100</sub> Eiweiss                         | Spontan                                                                          | Dormiol, Spermin<br>wiederholt, Venaesekt<br>100 ccm <sup>3</sup> 2mal. Heisser<br>Wickel. Campher,<br>Coffein                                                                                                                                      | Diagnose: Eklamps puerp.<br>Nephritis duplex. Necros-<br>renis dextra. Necrosis<br>haemorrhagica hepatis.<br>Hyperaemia et Oedema<br>pulmonum Degeneratio<br>adiposa levis cordis.<br>Cystitis. Pyelitis dextra. | Unreif             | 1. Anfall 17 Stunden<br>post partum. Temper-<br>stieg während der Anf.<br>bis 39,0<br>Puls 140-160                                                             |

1907

| No und Datum          | Alter Para | P. d. g. | Total | Urin                         | Entbindung                                                                                                       | Medicamentöse Therapie                                                                                                                                                                                    | Zustand der Mutter                                                                                                                                                            | Zustand des Kindes                         | Bemerkungen                                                                                                                          |
|-----------------------|------------|----------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40<br>61<br>4. I.     | 25<br>I    |          |       | 25,5 ‰ Eiweiss               | Einleitung der Frühgeburt                                                                                        | Dormiol 6 gr p. clysmia<br>1,0 Spermin subcutan<br>Thyreoidintablette per<br>clysma                                                                                                                       | Nach 43 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                                                                            | Frühreif<br>lebend                         | Transport in die Klinik<br>im bewusstl. Zust. Eintr.<br>der Frühgeburt b. Auftret.<br>von Prodromalsymptomen<br>wie Kopfschmerz etc. |
| 41<br>123<br>18 I.    | 30<br>VII  | 8        |       | Urin blutig<br>Eiweiss reich | Nach dem 8. Anf. Di-<br>latation nach Bossi,<br>Wendg. aus Querlag.<br>Extract n. Perforat.<br>des nachf. Kopfes | Mö 0,01, Dorm. 6 gr per<br>clysma, 20 gr Spermin<br>subcut., Thyreoidin 3,94<br>p. clysma, Campher                                                                                                        | Exitus während der Extrac-<br>tion, Diagnose: Paren-<br>chymatöse Nephritis. Anti-<br>typische Infarcte der rechten<br>Niere. Grosses Herz, massive<br>der plie n. Dilatation | Perforiert                                 | Zu Hause nach längerer<br>Unwohlsein 2 Anfälle<br>Einfrierung in<br>bewusstlosom Zustand                                             |
| 42<br>222<br>9. II.   | 31<br>II   | 4        | 22 36 | 3 ‰ Eiweiss                  | Eihautstich dann<br>Spontangeburt<br>nach dem 4. Anf.                                                            | Mö 0,01 n. d. Anf., dann 6 gr<br>p. clysma, 20 gr Spermin<br>subcut., 3,94 p. clysma,<br>V. v. n. s. c. Thyreoidintabl.<br>3,94 p. clysma, V. v. n. s. c.<br>60 cm 3 Campherinjektion,<br>ständl. Mö 0,01 | ✱<br>am 6. Tag<br>keine Diagnose                                                                                                                                              | Frühreif, lebend<br>Tod nach 1/4<br>Stunde | Zu Hause 3 Anfälle<br>Einfrierung in<br>benommenem Zustand                                                                           |
| 43<br>357<br>14. III. | 28<br>I    | 2        |       | 8 ‰ Eiweiss                  | Schnellentbindung<br>durch Forceps                                                                               | 6 gr Dorm., 3 Thyreoid-<br>tabl., 20 Spermin subc.<br>Heisse Wickel, Kochsalz-<br>inf., Milch Liq Kali acet.                                                                                              | Nach 35 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                                                                            | Lebend, reif                               | Zu Hause 2 Anfälle<br>Oedeme der Beine<br>Somnolenz. Durch<br>Therapie nehmen Oe-<br>deme ab                                         |
| 44<br>763<br>23. VI.  | 21<br>I    | 3        |       | 24 ‰ Eiweiss                 | Accouchement forcé<br>Dilatation n. Bossi<br>Forceps                                                             | Nach dem 3. Anfall<br>6,0 gr Dormiol                                                                                                                                                                      | Nach 15 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                                                                            | Lebend, reif                               | In den letzten 3 Wochen<br>starke Oedem. Patientin<br>wird wegen Nephritis<br>in die Klinik geschickt                                |
| 45<br>854<br>14. VII. | 27<br>I    | 1        | 9 10  | 28 ‰ Eiweiss                 | Blasenstich, Nach<br>dem 1. Anfall Ent-<br>bindung durch<br>Forceps                                              | Heisser Wickel und<br>Dormiol 3,0 gr<br>Mö 0,01                                                                                                                                                           | Nach 15 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                                                                            | Lebend, reif                               | Nach dem 1. Anfall<br>Entbindung, trotzdem<br>9 weitere Anfälle<br>Wochenbett febril                                                 |
| 46<br>1450<br>7. XII. | 24<br>I    |          | 4     | 6 ‰ Eiweiss                  | Zwillingsgeburt zu<br>Hause bei klarem<br>Bewusstsein                                                            | Da keine Anfälle auf-<br>getreten sind in der<br>Klinik, keine Therapie                                                                                                                                   | Nach 24 Tagen in<br>häusliche Pflege ent-<br>lassen<br>Eiweiss 1 ‰ <sub>100</sub>                                                                                             | ?                                          | Bei Ankunft starke<br>Somnolenz, Oedeme der<br>Beine.<br>Gegen Abend Orient-<br>tierung                                              |

1908

| No und Datum          | Alter Para | P. | P. | Urin                             | Entbindung                                                                        | Medicamentöse Therapie                                                                              | Zustand der Mutter                                     | Zustand des Kindes                                                                                                                                                                                                                                     | Bemerkungen                                                                                    |
|-----------------------|------------|----|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47<br>121<br>19. I.   | 24<br>I    | 8  | 8  | 1/2 ‰ Eiweiss                    | Spontan                                                                           | Mö u. Wickel, Parathy-<br>subcut. verschieb. Male,<br>Weg. schl. Puls Coffein                       | Am 3. Tage Verwirrung<br>die in Psychose über-<br>geht | ?                                                                                                                                                                                                                                                      | Zu Hause norm. Geburt<br>27 St. dann 1. Anf. Eintritt<br>in bewußt. Zustand                    |
| 48<br>282<br>2. II.   | 20<br>I    | 11 | 11 | Urin trüb mit<br>reichl. Eiweiss | Accouchement forcé<br>Nachd. II. Anf. Dilat.<br>nach Bossi. Forceps               | Parathyreoidin Vassale<br>subcut. Campher. Parath.<br>wiederholt injeziert                          | Nach 27 Tagen geheilt<br>entlassen                     | Lebend, frühreif                                                                                                                                                                                                                                       | Bei Eintritt Somnolenz                                                                         |
| 49<br>727<br>19. III. | 27<br>I    | 2  | 2  | 8 ‰ Eiweiss                      | Spontan, nach der<br>Geburt rasche Er-<br>holung                                  | Stündliche Injektionen<br>von Parathyreoidin<br>Milchdiät                                           | Nach 12 Tagen geheilt<br>entlassen                     | Gesund, frühreif                                                                                                                                                                                                                                       | Zu Hause Nephritis<br>Oedeme, Eintritt in die<br>Klinik bei klarem Be-<br>wusstsein. Kopfschm. |
| 50<br>519<br>10. IV.  | 26<br>I    | 4  | 4  | 2 ‰ Eiweiss                      | Spontangeburt                                                                     | Alle 1 1/2 Std. Injektion v.<br>Parathyreoidin, Dorniol<br>gr. 3, dann wied. Parath.                | keine pathog. Diagnose<br>✕✕                           | Lebend, reif                                                                                                                                                                                                                                           | Nach d. Geb. Kopfsehm.<br>dann plötzl. Anf. darauf<br>völlige Bewusstlosigkeit                 |
| 51<br>571<br>10. IV.  | 26<br>I    | 3  | 3  | 1/2 ‰ Eiweiss                    | Forceps                                                                           | Parathyreoidin 1.0 sub-<br>cutan, dieses wird alle<br>1 1/2 Stunden wiederholt                      | Nach 29 Tagen geheilt<br>entlassen                     | Kind gleich stünd-<br>lich nach 24 Stunden<br>in Krämpfen der<br>Armen, Finger be-<br>sond. h. trinken.<br>Diese wiederholen<br>sich an d. 2 nachl.<br>Tagen, verschied.<br>male. Nach 29 Tag.<br>gesund, entlassen.<br>Parathyreoidin-<br>Injektionen | Zu Hause 2 Anfälle.<br>Eintritt in benommen.<br>Zustand                                        |
| 52<br>571<br>21. IV.  | 27<br>I    | 1  | 1  | 1 1/2 ‰ Eiweiss                  | Zu Hause Zangen<br>geburt                                                         | Während 24 Stunden<br>3stündlich 1 Spritze<br>Parathyreoidin                                        | Nach 10 Tagen geheilt<br>entlassen                     | Kind nach 3<br>Tag auswärts<br>gestorben                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| 53<br>748<br>2. VI.   | 30<br>I    | 1  | 2  | 14 ‰ Eiweiss                     | Spontan                                                                           | Sesacornin wegen<br>Blutung alle 1 1/2 Stund.<br>Parathyreoidin injezt.<br>Dorniol p. clysmu 0.4 gr | Nach 13 Tagen geheilt<br>entlassen                     | Reif, lebend                                                                                                                                                                                                                                           | Während Dammmaht<br>1. Anfall                                                                  |
| 54<br>819<br>20. VI.  | 36<br>VIII | 1  | 1  | 25 ‰ Eiweiss                     | Accouchement forcé<br>Dilatation nach<br>Bossi. Wendung auf<br>den Fuss. Extract. | Wegen schlechtem Puls<br>Campher, Coffein Koch-<br>salzinfusion. Mö 0.01<br>subcutan                | ✕✕                                                     | Lebend, frühreif                                                                                                                                                                                                                                       | Zu Hause Oedeme                                                                                |

|                         |    |                  |                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55<br>855<br>28. IV.    | 42 | Keine<br>Anfälle | 6‰ Eiweiss                                                   | Spontan                                                                      | Stündl. Parathyreoidin-<br>injektionen                                                                                                                    | Entlassen geheilt nach<br>29 Tagen                                                               | Lebend, reif                                      | Nach d. Geb. Kopfschm.<br>Zeitweise Zuckungen in<br>der Gesichtsmuskulatur.<br>Bangigkeit auf der Brust                                             |
| 56<br>862<br>30. VI.    | 31 | 1                | 25 ‰ Eiweiss<br>nach 9 Tagen<br>Spuren                       | Multiple Incisionen<br>Forceps. Nach der<br>Entbindung kein<br>Anfall mehr   | Parathyreoidin wieder-<br>holt injiziert                                                                                                                  | Nach 10 Tagen geheilt<br>entlassen                                                               | Lebend, reif                                      | 1. Anf. ohne Prodrome                                                                                                                               |
| 57<br>867<br>30. VI.    | 23 | Keine<br>Anfälle | 3‰ Eiweiss<br>nach 5 Tagen<br>verschwunden                   | Es fand keine Ge-<br>burt statt                                              | Stündlich 1,0 gr Para-<br>thyreoidin                                                                                                                      | Nach 14 Tagen unent-<br>bunden entlassen                                                         | ?                                                 | Gravida im VII. Mt. Zu<br>Hause seit 3 T. Krämpfe<br>Zuckungen in d. Extrem.<br>B. Eintr. i. d. Kl. erw. Som-<br>nolenz. Ekl. od. Nephrr.?          |
| 58<br>938<br>18. VII.   | 23 | 4                | 2‰ Eiweiss<br>nach 6 Tagen<br>verschwunden                   | Nach dem 5. Anfall<br>4 couchementforcé<br>Dilatation nach<br>Bossi. Forceps | Nach dem 5. Anfall<br>Dormiol p. clysmas 4,0 gr<br>dann Parathyreoidinthe-<br>rapie. Stauungsbinde<br>um den Hals. Milchdiät                              | Nach 20 Tagen geheilt<br>entlassen                                                               | Lebend, frühreife                                 |                                                                                                                                                     |
| 59<br>967<br>20. VII.   | 34 | 2                | Anf. 16‰ Eiw.<br>steigen bis 24‰<br>Nach 10 Tagen<br>noch 2‰ | Einleitung d. Früh-<br>geburt nach Barne-<br>schon Ballon<br>Spontangeburt   | 8 Tage lang Parathy-<br>reoidinbehandlung<br>4 Tage lang Phoenix                                                                                          | Nach 28 Tagen geheilt<br>entlassen                                                               | Bei der Geburt<br>34 cm lang<br>✱<br>nach 9 Tagen | In den letzten Monaten<br>der Schwangerschaft<br>Nierenerkrankung. Zu<br>Hause 2 Anfälle                                                            |
| 60<br>1095<br>20. VIII. | 23 | 1                | 1‰ Eiweiss<br>nach 2 Tagen<br>verschwunden                   | Spontan                                                                      | Nach dem 1. Anfall<br>Isolierung<br>Parathyreoidinbehandl.                                                                                                | Nach 11 Tagen geheilt<br>entlassen                                                               | Lebend, reif                                      | Anfall 6 Stunden nach<br>der Geburt                                                                                                                 |
| 61<br>1358<br>26. X.    | 23 | 25               | Urin gerinnt<br>beim Kochen<br>14‰ Eiweiss                   | Spontan                                                                      | Währ. der 1. Anf. Para-<br>thyreoidin injekt i. P. u. s.<br>von 2 Std. Dosis 1,0 gr.<br>Auch Dorm.-Therapie<br>zeigt keine Wirkung<br>Nierendecapsulation | ✱<br>Keine patholog.<br>Befunde                                                                  | Lebend, reif                                      | Nach der Geburt Kopf-<br>schm. Amaurose. Einfl.<br>in die chirurg. Klinik<br>im comatosen Zustand.<br>Oedeme. Cyanose. Amg.<br>frequent. Puls klein |
| 62<br>1517<br>11. XII.  | 30 | 14               | Urin bräunlich<br>40‰ Eiweiss                                | Nach dem 14. Anf.<br>vaginaler Kaiser-<br>schnitt n. Dührssen                | Dormiol p. clysmas 1,1<br>Parathyreoidin<br>Koelsaklinston<br>Coffein. Campher                                                                            | ✱<br>Pathog. Diagnose:<br>Trombosen n. Nekrosen<br>der Leber, Verletzung d.<br>Niere, Hirnoedeme | Perforiert<br>37 cm lang                          | Zustand immer<br>schlechter werdend                                                                                                                 |

1909

| No und<br>Datum        | Alter<br>Para | Gr. | P. | P. p. | Total | Urin                  | Entbindung                                                              | Medicamentöse<br>Therapie                                             | Zustand der Mutter                                                                                                            | Zustand<br>des Kindes                                           | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------|-----|----|-------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63<br>363<br>8. III.   | 34<br>I       |     | 4  | 3     | 7     | 2‰ Eiweiss            | Multiple Incisionen<br>Forceps                                          | Dormiol 5,0 gr p clysm<br>1,0 Parathyreoidin<br>wiederholt. Phoenix   | ✕<br>Diagnose: Urogenital-<br>fistel, Ureter u. Mast-<br>darmsfistel, Pyonephrose<br>beiderseits, chronische<br>Lungentubere. | Hydrocephalus<br>reif, lebend<br>nach einiger<br>Zeit gestorben | Zu Hause 2 Anfälle<br>Vorher seit mehreren<br>Tagen Schmerzen in<br>der Nierengegend<br>Eintritt in die Klinik in<br>leicht benommenem<br>Zustand                                                                                                       |
| 64<br>652<br>11. V.    | 30<br>I       |     | 4  | 4     |       | Spuren von<br>Eiweiss | Spontan                                                                 | Dormiol 4,0 gr<br>feuchte Einpackung<br>und zwar wiederholt           | Nach 22 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                            | Lebend, reif                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 65<br>1036<br>24. VII. | 30<br>I       |     | 3  | 1     | 4     | 15‰ Eiweiss           | In Chloroformmark.<br>Bossi. Perforation<br>des nachfolgenden<br>Kopfes | Dormiol 4,0 gr<br>Phoenix-Schwitzkur,<br>Mischdiät, Vichy<br>Diuretin | Beim Entlassen Spur-<br>weise Eiweiss im Urin.<br>Entlassung am 16. Tage                                                      | Perforiert                                                      | In der letzten Zeit<br>Schwellung der Beine<br>Kopfschmerzen, Erbre-<br>chen, Schwellung der<br>Leber. Beim Eintritt<br>Ödem d. Unterschenkel<br>und des Gesichts. In<br>den ersten 4 Tagen Urin<br>nur durch Katheter zu<br>lösen<br>Schwere Nephritis |
| 66<br>1099<br>26. VII. | 29<br>I       |     | 4  | 4     |       | 2‰ Eiweiss            | Spontane<br>Zwillingsgeburt                                             | Dormiol 3,0 gr per<br>Müchelsyna                                      | Nach 14 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                            | ?                                                               | 3 Stunden post partum<br>schwacher Anfall                                                                                                                                                                                                               |

|                        |         |  |    |                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                             |
|------------------------|---------|--|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67<br>1182<br>26.VIII. | 33<br>1 |  | 5  | 19‰ Eiweiss<br>Nach 2 Tagen<br>verschwunden | Nach dem 5. Anf.:<br>Dilatation n. Bossi,<br>Zwilling, Perforat,<br>des ersten, Wende,<br>auf den Fuss und<br>Extraction des<br>zweiten | 6,0 gr Dormiol per<br>Milchclysma mehrmals                                                                       | Nach 15 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                   | Erstes perfor.,<br>zweites lebend,<br>reif | Zu Hause mehrere<br>Anfälle                                                                                                 |
| 68<br>1203<br>31.VIII. | 24<br>1 |  | 1  | Kein Eiweiss                                | Spontangeburt                                                                                                                           | Dormiol 6,0 gr nachher<br>Beruhigung.<br>Kein Anfall mehr                                                        | Nach 10 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                   | Gesund und<br>lebend                       |                                                                                                                             |
| 69<br>12<br>7. IX.     | 27<br>1 |  | 21 | 8‰ Eiweiss                                  | Spontan                                                                                                                                 | Dormiol 3 gr. Scopola-<br>min und Mo wegen<br>starker Aufregung<br>Therapie hat keinen<br>Erfolg                 | ✠<br>Lungenodem und<br>Stauung der Organe<br>Ascites, frühe Schwell.<br>der Leber, Rundzellen-<br>sarkom der Ovarien | Unreif im<br>VIII. Monat                   | Eine halbe Stunde nach<br>Spontangeburt eines<br>unreif. Kindes 1. Anfall<br>Eintritt in die Klinik<br>im soporösen Zustand |
| 70<br>1501<br>8. XI.   | 30<br>X |  | 6  | 12‰ Eiweiss                                 | Einleitung d. Früh-<br>geburt Blasenstich<br>Mètreurynter dann<br>Ausstossung einer<br>matschen 34 cm lg.<br>Frucht                     | Dunkelzimmer, Dormiol<br>6,0 gr, nach einem<br>weiterm. Anfall wieder<br>Dormiol, Mo, wegen<br>kopitw. Pyramiden | Nach 17 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                   | Totmatsche<br>Frucht                       | Seit einziger Zeit Nieren-<br>leidend, öfters Kopf-<br>schmerzen, Flimmern<br>vor den Augen, Be-<br>wusstlosigkeit          |
| 71<br>1631<br>6. XII.  | 29      |  | 6  | 3‰ Eiweiss                                  | Forceps nach dem<br>6. Anfall                                                                                                           | Keine                                                                                                            | Nach 24 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                   | Lebend, reif                               | Zu Hause 4 Anfälle<br>innerhalb 7 Stunden.<br>Eintritt im tiefen Sopor                                                      |

1910

| No und Datum          | Alter Para | G. | P. | Total | Urin                                                                                   | Entbindung                                                                                                                                   | Medicamentöse Therapie                                                                                                                                                                                         | Zustand der Mutter                            | Zustand des Kindes | Bemerkungen                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|------------|----|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72<br>18. XIII.<br>09 | 30<br>VI   | 4  | 4  | 4     | ?                                                                                      | Nach dem 3. Anfall Schnellentbindung; Dilatation n. Bossi. Holte Zange. Während der Vorbereitung zur Operation noch ein Anfall               | Medicament-Therapie keine                                                                                                                                                                                      | Nach 21 Tagen geheilt entlassen               | Lebend, reif       | Eintritt ins Spital 9.15 p. m. Patientin hatte schon vorm Kopfschm. Flimmern vor d. Augen. Zu Hause 2 Anfälle, auf dem Transport der dritte. Im Verlauf des Wochenb. 2mal Temp.-Steiger, infolge Cystitis |
| 73<br>128<br>18. I.   | 41<br>V    | 6  | 1  | 7     | 22,5 ‰ Eiweiss                                                                         | In Chloroformmark. Einlegen des Hysteriniers. Nach 3 Stunden wird dies ausgestossen. In Chloroformmarkose Zangenversuch und dann Perforation | Diät                                                                                                                                                                                                           | Nach 16 Tagen entlassen Allgemeinbefinden gut | Perforiert         | Zu Hause 5 Anfälle am Morgen starke Kopfschmerzen und Fieber, Abends 1. Anfall Wochenbett afebril                                                                                                         |
| 74<br>101<br>25. I.   | 33<br>IV   | 4  | 4  | 4     | 4,8 ‰ Eiweiss<br>Urin viel granulierte Cylinder<br>Leucocythion<br>rote Blutkörperchen | 25.9h. p. m. Blasenstich 26,8h dann Spontangeburt complicato corpore der totfaulen Frucht                                                    | Dormiol 30gr nach dem 2. Anfall<br>Salzfreie Kost                                                                                                                                                              | Nach 11 Tagen geheilt entlassen               | Totfaul            | Seit 14 Tagen hat Patientin Kopfschmerzen; es wird ihr schwarz vor den Augen. Oedeme der Beine. Seit der Nacht 24. auf 25. Kopfweh stärker<br>Urin dunkelbraun                                            |
| 75<br>470<br>23. III  | 30<br>IV   | 3  | 2  | 6     | 6 ‰ Eiweiss                                                                            | Erweiterung nach Harris-Bonaire Blasenstich mit von Herff'schem Blasenstecher. Nach 2 Std. Einlegen des Bossi'schen Dilatators               | Nach dem 1. Anfall Mō 0,015, nach dem 2. Dormiol 4,0 gr und zwar wiederholt. Wegen Blutung infolge Cervixrisse Secuacornin Campher, Coffein wegen schwacher Herztonie u. keinen Puls. Trotzdem keine Besserung | Keine Diagnose<br>✕                           | Tot                | Vor Auftreten der Anfälle hatte Patientin daheim Kopfschmerzen, Erbrechen und zwar 3 Tage vor dem 1. Anfall<br>Eintritt ins Spital bewusstlos, reagiert auf Anrufen nur durch Augenaufschlag              |

|                         |          |    |     |                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76<br>402<br>21. III.   | 27<br>1  | 30 | 131 | ?                                                                                                                 | Krysteller<br>Placenta spontan                                                                                            | Dormiol 4,0 gr p. clysm.,<br>Mö 0,015, nachher ist<br>Patientin ziemlich ruhig                                                                                                                                                                       | ✠<br>Exitus auf der eitrigen<br>Abtheilung<br>Keine Diagnose                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tot                                            | Einige Stunden vor dem<br>Anfall klagt Patientin<br>über Krämpfe, Schwin-<br>del, Erbrechen und<br>Flimmern vor den Aug.<br>Nachher Anf. alle 10<br>Minuten. Bewusstsein<br>seitdem geschwunden.<br>Pat. hat nie mehr ge-<br>redet. Am 2. Tag 39,5<br>Fieber u. 136 Puls, Starke<br>Cyanose, Trachealrasseln |
| 77<br>902<br>19. VI.    | 40<br>II |    |     | Urin spärlich<br>sogar mit den<br>Kathed.<br>Brauner Urin<br>2,4 % Leuco-<br>cythen, Erythro-<br>cythin. Cylinder | ?                                                                                                                         | Venaesection ca. 200ccm<br>Blut entnommen<br>Verabreichung von<br>circal 40ccm, Trauben-<br>zuckerlösung                                                                                                                                             | Secundäre Sch. unipf-<br>niere, Keratitis albu-<br>minurica, Haemorha-<br>gien, Exzentrische<br>Herzhypertrophie, Ha-<br>emorrhagien, Nekrosen<br>der Leber, Bedeutende<br>Spizentuberkulose                                                                                                                                                          | ?                                              | Patientin fühlt sich<br>schlecht, ist etwas be-<br>nommen                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 78<br>1179<br>12. VIII  | 27<br>1  | 7  | 7   | Viel Albumin                                                                                                      | Manuelle Dilatation<br>nach Harris-Bonaire<br>dann Dilatat nach<br>Bossi, Forceps<br>Schnellenbindung<br>nach dem 7. Anf. | Nach dem ersten Anf.<br>4,0 gr Dormiol p. rect.<br>Nach dem 3. 0,015 Mö<br>u. leichte Chloroform-<br>narkose (15-20 Tropfen)<br>Nach dem 6. Anf. 0,2<br>zufuhr. Campher, Coffein<br>wegen schlechtem Puls.<br>Intravenöse Injektion<br>von Digitalen | ✠<br>an zunehmend. Lungen-<br>oedem. Diagnose:<br>Eklampsie, Stasus puer-<br>peralis, Leichte Hyper-<br>trophie u. Dilatation des<br>Herzens beiderseits.<br>Chron. n. öse Lungen-<br>tubercul., Pleuritis ad-<br>haesiva beiders. Mul-<br>tipl. Nekros. u. Haemorrh.<br>in der Leber. Haemorrh.<br>in Meningin, im Mag u.<br>Darm-Lungenged. rechts. | Tot infolge<br>vorzeitiger Pla-<br>centalösung | Seit 4 Wochen geschw.<br>Füsse, Oedeme der<br>Hände u. Bauchdecken<br>12. VIII. Erbrechen,<br>Flimmern vor d. Augen<br>Aufgeregtheit                                                                                                                                                                         |
| 79<br>1223<br>19. VIII. | 23<br>I  | 3  | 3   | 2 1/2 % Eiweiss                                                                                                   | In Chloroformnark.<br>vaginater Kaiser-<br>schnitt und darauf<br>Forceps                                                  | Nach dem 3. Anfall<br>leichte Chloroformnark.<br>u. Moijektion 0,015<br>Dormiol per rectum<br>Mö 0,015                                                                                                                                               | Bei der Entlassung<br>1 % Eiweiss<br>Es wird ihr ans Herz<br>gelegt sich weiter be-<br>handeln zu lassen                                                                                                                                                                                                                                              | Lebend u. reif                                 | Zu Hause 2 Anf. Nach<br>Einr. gleich der dritte.<br>Währ. der Nacht von<br>19/20. ist Pat. unruhig,<br>will aufstehen u. klagt<br>über heft. Kopfschm.<br>Auf Mö wird sie ruhiger<br>Tagsüber ist sie somnol.                                                                                                |

|                       |         |   |   |                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80.<br>1313<br>10.IX. | 29<br>I | 4 | 4 | Kein Eiweiss.<br>Harn nur mit<br>dem Katheter<br>zu lösen u. zwar<br>4 Tage lang | In Chloroformmark.<br>Forceps                                                                                                        | Wegen blutigem Aus-<br>fluss Ergotin                                                                                                                         | Nach 14 Tagen in or-<br>dentlichem Zustand<br>entlassen<br>Urin noch trüb ohne<br>Eiweiss. Viele Leuco-<br>cythen und wenig<br>Blasenepithelien | ?            | Zu Hause 1 Anfall<br>auf dem Transport 3<br>weitere. In der Klinik<br>keiner mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81<br>1346<br>19.IX.  | 43<br>I | 5 | 5 | $1\frac{1}{2}$ ‰ Eiweiss                                                         | Kristeller<br>Epistomie                                                                                                              | Sofort nach dem Ein-<br>tritt 0,015 Mō, 4,0 gr<br>Dormiol per clysmas u.<br>zwar wiederholt<br>Kochsalzarzne Diät                                            | Nach 25 Tagen ent-<br>lassen<br>Allgemeinbefinden gut                                                                                           | Lebend, reif | Patientin hatte wäh-<br>rend der Schwangerschaft<br>wiederholt Erbrechen;<br>Oedeme der Füße und<br>der Hände. Zu Hause<br>5 Anfälle; nach dem 1.<br>vollständ. Bewusstlosig-<br>keit. Bei Eintritt in<br>Spital ist sie vollstän-<br>dig klar. Muttermund ge-<br>schlossen. In der Klinik<br>keine Anfälle mehr.<br>Pat. war immer Fieber-<br>frei. Geburt am 23 IX. |
| 82<br>1482<br>16.X.   | 22<br>I | 5 | 5 | $4\frac{1}{100}$ Eiweiss                                                         | Kurz nach Eintritt<br>sofortige Entbindg.<br>Forceps<br>In Chloroformmark<br>Credé wegen leicht.<br>Blutung. Placenta<br>vollständig | Vor der Entbindung<br>0,015 Mō, Dormiol 4,0 gr<br>per clysmas, Mō 0,015<br>Dormiol 4,0 gr<br>Wegen Mastitis Hoch-<br>binden, Carbol-<br>umschläge. Eisbeutel | Nach 14 Tagen geheilt<br>entlassen                                                                                                              | Lebend, reif | Im Verlauf des 7. Mon.<br>häufige Krämpfe, keine<br>geschwollenen Füße.<br>Zu Hause 2 Anf. Nach<br>Spitaleintritt sofort 2<br>aufeinander folgende<br>Anfälle. Während der<br>Nacht vom 16./17. ist<br>Patientin unruhig, doch<br>kein Anfall mehr. Am<br>Morgen ist Patientin<br>klar. Leichte Mastitis<br>im Wochenbett Geringe<br>Temperatursteigerung             |

Aus dieser tabellarischen Zusammenstellung gehen folgende Schlussfolgerungen hervor:

In dem Zeitraume von 1901–1910 fanden in der Basler-klinik 13 848 Geburten statt; darunter befanden sich 82 Eklampsiefälle. Auf fast 169 Geburten kommt also ein Fall von Eklampsie. Das entspricht 0,58 ‰. Dieser Prozentsatz nähert sich der von *Löhlein* gefundenen Zahl 1 : 160 (0,62 ‰). *Kosinsky* fand nach dem Material der Münchner Frauen-klinik eine der unsrigen sehr nahestehende Frequenz, nämlich 1 : 179 = 0,56 ‰. Die *Charité*annalen weisen ein Ver-hältnis von 1 : 50 (2 ‰) auf. Die *Kölner Hebammenschule* gibt 1 : 65 = 1,54 ‰; *Glockner* 1 : 49,76 = 2,01 ‰; *Bidder* findet 1 : 123 = 0,81 ‰; *Schauta* 1 : 400 = 0,25 ‰; *Rosthorn* 1 : 204 (0,49 ‰); *Meyer-Wirz* 1 : 117 (0,84 ‰); *Wyder* 1 : 826 (0,12 ‰); *Harig* 1 : 579 (0,17 ‰). Für sämtliche Geburten schätzt *Löhlein* das Verhältnis auf 1 : 675 (0,15 ‰). Andere auf 1 : 500 (0,20 ‰). Für Mecklenburg berechnet *Büttner* das Verhältnis 1 : 625 (0,16 ‰).

Diese Statistiken zeigen einen grossen Unterschied im Auftreten dieser gefährlichsten Geburtskomplikation; worauf diese Erscheinung beruht, lässt es sich nicht so leicht sagen. Denn wie sollte man sich den Gegensatz erklären, dass in vielen Gegenden die Eklampsie häufig auftritt, während andere Länder fast immun sind? So fand *Döderlein* für Württemberg, dass erst auf 3561 Geburten ein Eklampsie-fall vorkam, also in Prozenten ausgedrückt 0,027 ‰. Solange man noch über die wirkliche Aetiologie dieser schlimmen Komplikation der Schwangerschaft im Dunkeln ist, solange wird man dieser Frage die Antwort schuldig bleiben.

Wir betrachten nun die Zahl der in den einzelnen Jahren vorgekommenen Eklampsiefälle, so finden wir, dass die Frequenz Schwankungen unterworfen ist, so:

|      | Geburten     | Eklamp.-Fälle |   | ‰    |
|------|--------------|---------------|---|------|
| 1901 | 1050         | 6             | = | 0,57 |
| 1902 | 1028         | 7             | = | 0,68 |
| 1903 | 1166         | 4             | = | 0,34 |
| 1904 | 1245         | 8             | = | 0,64 |
| 1905 | 1330         | 7             | = | 0,52 |
| 1906 | 1397         | 7             | = | 0,50 |
| 1907 | 1500         | 7             | = | 0,46 |
| 1908 | 1610         | 16            | = | 0,93 |
| 1909 | 1726         | 9             | = | 0,48 |
| 1910 | 1796         | 11            | = | 0,69 |
|      | <hr/> 13 848 | <hr/> 82      |   |      |

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass der Prozentsatz durchschnittlich 0,56 % beträgt. Nur das Jahr 1908 weist eine fast doppelte Frequenz als die übrigen Jahre. Da fast alle Eklampsien dem Frauenspital erst nach Ausbruch der Krämpfe zugeführt werden, mancher Fall häuslich behandelt worden sein mag — es existiert ja natürlich kein Zwang, solche Schwerkranke einer Anstalt zu überweisen — so können diese Differenzen schon allein durch diesen Umstand erklärt werden. Auch sind die Zahlen so klein, dass der wahrscheinliche Fehler des Zufalles zu einer Erklärung genügt. Vermutungsweise konnte man an einen Witterungseinfluss denken; und in der Tat, gehäuftes Auftreten von Eklampsiefällen im Jahre 1908 finden wir im April, der nach den meteorologischen Aufzeichnungen ein regensreicher Monat war, in welchem der Luftdruck ziemlich häufigen Schwankungen unterworfen war. Gerade am 20., wo zwei Eklampsiefälle in unserer Anstalt auftraten, fanden wir den höchsten Luftdruck des Monats aufgezeichnet. Auch der Monat Juni 1908, in welchem gehäufte Fälle von Eklampsie auftreten, zeigt häufige Regengüsse mit starken Gewittern. In diesem Monate traten 5 Fälle auf, von welchen 3 gehäuft vorkamen und zwar in einem Zeitraum, in welchem ein nasses Wetter vorherrschend war. Für den Fall im Monat Oktober finden wir auch etwas besonderes im Wetter. Die Eklampsie trat Morgens des 26. auf. Am 25. findet man den tiefsten Luftdruck des Monats aufgezeichnet. Für den im Dezember vorgekommenen Fall findet sich am selben Tage den tiefsten Luftdruck des Monats angegeben. Dass also ein Zusammenhang zwischen Auftreten von Eklampsie und gewissen Witterungszuständen besonders regensreichen und gewitterhaften Tagen besteht, erscheint unleugbar. Wie aber das zu erklären ist, lässt sich nicht so leicht sagen. *Dührssen* will diese Erscheinung dadurch erklären, dass durch die Einwirkung der feuchten Witterung auf die schon erkrankten Nieren eine Häufigkeit der Eklampsie bedinge.

*Zangenmeister* hat auch an Hand von 45 Fällen gefunden, dass die Eklampsie häufiger in gewitterhaften Sommermonaten auftritt, eine Erscheinung, die er in Beziehung zu der Schweissekretion bringen möchte.

Auf das Klima schob man die Tatsache, dass die Eklampsie in verschiedenen Ländern, resp. Städten, verschieden häufig und verschieden schwach auftritt. Auch *Büttner* kommt in seiner Arbeit über die Eklampsie im Grossherzog-

tum Mecklenburg-Schwerin zum Schlusse, dass der Witterung ein Einfluss auf die Frequenz der Eklampsie nicht geleugnet werden kann. Dagegen hat *Meyer-Wirz* alle Witterungsfaktoren an den Eklampsietagen, sowie an den vorhergehenden und folgenden Tagen zusammengestellt und daraus gefolgert, dass keinerlei sichere Anhaltspunkte vorhanden sind, aus denen ein Einfluss der Witterung auf die Entstehung der Eklampsie hervorgehen würde.

Auf die einzelnen Monate verteilen sich die Fälle wie folgt:

|         |    |           |    |
|---------|----|-----------|----|
| Januar  | 11 | Juli      | 11 |
| Februar | 3  | August    | 8  |
| März    | 8  | September | 7  |
| April   | 5  | Oktober   | 5  |
| Mai     | 2  | November  | 8  |
| Juni    | 11 | Dezember  | 8  |

Wenn wir die Wintermonate von September bis Februar rechnen, so erhalten wir für diese 37, für die Sommermonate 45, natürlich unter der Voraussetzung, dass die Einweisung der Kranken gleichmässig erfolgt, was aber nicht zu beweisen ist und im allgemeinen bei solch kleinen Reihen nicht wahrscheinlich erscheint. Also man findet eine grössere Zahl für die Sommermonate. Bekanntlich fand *Olshausen* ein Ueberwiegen der Wintermonate, ebenso *Veit*, während bei uns und nach *Leske* die Mehrzahl auf die Sommermonate fällt. Was nun den Einfluss der Witterung auf die Entstehung der Eklampsie anbelangt, ergibt für meine Fälle eine genaue Durchsicht der meteorologischen Tabellen der Stadt Basel, für deren freundliche Ueberlassung ich Herrn Prof. *Riggenbach* an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche, dass besonders in jenen Monaten, wo gehäufte Fälle von Eklampsie vorkommen, Neigung zu gewitterhaftem Wetter mit häufigen Regengüssen bestand. Was mir besonders auffiel, ist der Zusammenhang zwischen Ausbruch der Eklampsie mit den Schwankungen des Luftdrucks und zwar sowohl nach der Maximal- wie nach der Minimalgrenze in den betreffenden Monaten und zwar am Tag des Ausbruches selber, oder am vorhergehenden Tage. Ich gebe gerne zu, dass die Eklampsie auch an solchen Tagen vorkam, wo die Witterung nichts besonderes bot, aber in der weitaus grössten Mehrzahl der Fälle fand sich doch eine Abnormität in Bezug auf Nebelbildung, Niederschläge und Gewitter mit häufigen Blitzen und Wetter-

leuchten. Es macht mir den Eindruck, als ob zu einer Zeit, wo die Luft mit Elektrizität geladen ist, eine grössere Disposition für den Ausbruch der Eklampsie gegeben ist. Auch nach Beobachtungen von Seite von Prof. v. Herff, traf wiederholt die Voraussage zu, dass Eklampsiefälle zu erwarten seien; doch kann es sich hiebei um einen Zufallstreffer handeln.

Wie nun der Zusammenhang zwischen Witterung und Eklampsie ist, ist nicht so leicht zu entscheiden. Wahrscheinlich ist das Wetter nur ein auslösendes Moment. Auch ein Schluss auf den Verlauf (leichter oder schwerer) der Eklampsie aus der Witterung ist nicht zulässig. *Schlichtig* kommt in seiner Disertation über dasselbe Thema zu demselben Resultate.

Auch in der vor mir aufgestellten Statistik überragen die Erstgebärenden die Mehrgebärenden und zwar alle Fälle zusammengekommen, während die einzelnen Jahrgänge verschieden sind, so z. B.:

1901 sind gleich stark vertreten, während im Jahre 1910 die Mehrgebärenden überwiegen. Von den Müttern waren also auf 10 Jahre berechnet:

|            |    |
|------------|----|
| Primiparae | 58 |
| Pluriparae | 24 |

Die Multiparae verteilen sich so:

|         |          |           |        |
|---------|----------|-----------|--------|
| 6 II p; | 3 III p; | 4 IV p;   | 4 V p; |
| 2 VI p; | 2 VII p; | 2 VIII p; | 1 X p. |

Nach diesen Zahlen finden wir die Beteiligung der Primiparae mit 71 %, die Pluriparae mit 29 % vertreten. Diese Zahlen stimmen mit denen der anderen Autoren überein, denn in anderen Statistiken findet man:

|                  | ‰ I P. |
|------------------|--------|
| Olshausen        | 74     |
| Winckel          | 76,8   |
| Skanzoni         | 79,6   |
| Zweifel-Glockner | 80     |
| Schauta          | 82     |
| Büttner          | 60     |
| Löhlein          | 75     |
| Rosinsky         | 62     |
| Basel            | 71     |

Wir sehen also aus dieser Zusammenstellung, dass die Beteiligung der Pluriparae zwischen 20–25 % angenommen

wird. Unser, ebenso *Büttner's* Ergebnis steht also in der Mitte zwischen den allgemein berechneten und den von *Kosinsky* gefundenen Werte.

Dieser Tatsache entsprechen natürlich die für das Alter der Eklampischen berechneten Zahlen. Haben wir ein Ueberwiegen der Primiparae, so müssen wir natürlich auch die jüngern Individuen in grösserer Anzahl vertreten sehen. Die folgende Tabelle giebt Aufschluss über das Alter der Mütter.

|              |       |   |    |
|--------------|-------|---|----|
| Im Alter von | 17—20 | = | 7  |
|              | 20—25 | = | 22 |
|              | 25—30 | = | 24 |
|              | 30—35 | = | 14 |
|              | 35—40 | = | 10 |
|              | 40—50 | = | 5  |

Es standen also im Alter von 17—30 = 53, also 64,7%; über 30 Jahre 29, also 35,3 %. Demnach scheinen die jüngern Individuen mehr der Gefahr dieser Erkrankung ausgesetzt zu sein. Diese Tatsache kann insofern eine Beziehung zu den Theorien über Eklampsie haben, als sie gegen diejenigen Hypothesen spricht, die in der erkrankten Niere ein auslösendes Moment für die Erkrankung an Eklampsie finden; denn die Häufigkeit der Nierenerkrankung bei ältern Frauen ist bekanntlich viel höher als bei jüngern Individuen.

Wäre die Eklampsie eine sekundäre Folge eines Nierenleidens, so würde man doch in den Altersstufen ein Ueberwiegen der Eklampsie erwarten, wo eine besondere Neigung zu Nierenerkrankungen besteht. Was nun die Krankheit selbst betrifft, so interessiert uns zunächst der Zeitpunkt des Eintretens derselben. Auch dieser Moment ist nicht gleichgültig für die Theorie. Wir brauchen hier nur daran zu erinnern, dass man die Eklampsie mit einem von gravidem Uterus ausgeübten Druck auf die Ureteren in Zusammenhang gebracht hat. Darnach dürfte eine Eklampsie nur dann entstehen, wenn der Uterus gross genug ist um einen Druck auf die Ureteren ausüben zu können. In unserem Material finden sich einige Fälle von Eklampsie in der ersten Hälfte der Schwangerschaft. Die meisten Fälle fallen allerdings in den zehnten Monat hinein; aber diese Tatsache, dass, wenn auch seltener, Erkrankungen in den ersten Monaten beobachtet werden, widerlegt die Drucktheorie als allgemein gültige Ursache. Hie und da mag der Druck auf die Ureteren ein begünstigendes, selbst auslösen-

des Moment abgeben. Erwähnt seien nebenbei noch die von *Olshausen* und von *Herff* beobachteten Fälle von Eklampsie im dritten und vierten Monat.

Im übrigen wächst die Anzahl der Erkrankungen proportional der Zahl der Schwangerschaftsmonate. Dieses Verhältnis geht klar auch aus unserer Statistik hervor. Von unsern 82 Fällen entfallen 36 auf den X. Monat, 17 auf den VII.—IX. Monat. Bei 9 steht in den Krankengeschichten nur „frühreif“. Von den übrigen 10, 2 sind unentbunden entlassen und bei den übrigen 8 ist aus den Krankengeschichten nichts bestimmtes zu ermitteln.

Das Eintreten der Eklampsie muss nicht nur in Bezug auf den Schwangerschaftsmonat, sondern auch mit Rücksicht auf die Schwangerschafts-, bzw. Geburtsperiode betrachtet werden. Es ist zweckmässig, in den diesbezüglichen Tabellen 7 Gruppen zu unterscheiden:

|    |                                 |          |
|----|---------------------------------|----------|
| 1. | Eklampsie nur in der Gravidität | 22       |
| 2. | „ „ „ „ Geburt                  | 18       |
| 3. | „ „ „ „ im Wochenbett           | 24       |
| 4. | „ „ „ „ in Grav. und Geburt     | —        |
| 5. | „ „ „ „ „ Puerp.                | 6        |
| 6. | „ „ „ „ Geburt und Puerp.       | 11       |
| 7. | „ „ „ „ Grav., Geb. u. Wochenb. | 1        |
|    |                                 | <hr/> 82 |

Daraus geht hervor, dass wir 27% Eklampsia gravidarum, 22% Eklampsia parturientium und 30% Eklampsia puerarum finden.

Die Frequenz ist also nach unserem Material in diesen drei Perioden fast gleich, während bei *Fehling* die Graviditätseklampsiefälle fast 50% einnimmt. Andere Autoren fanden:

|            |     | Ekl. grav.<br>% | Ekl. part.<br>% | Ekl. puerp.<br>% |
|------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| Schroeder  | 316 | 19,62           | 63,13           | 20,28            |
| Lantos     | 53  | 9,44            | 73,53           | 16,98            |
| Tietke     | 325 | 44              | 44              | 12               |
| Löhlein    | 385 | 31,69           | 44,92           | 23,29            |
| Olshausen  | 200 | 30              | 56              | 14               |
| Goldberg   | 81  | 25,97           | 57,14           | 16,88            |
| Meyer-Wirz |     | 53              | 27,3            | 19,7             |
| Basel      | 82  | 27              | 22              | 30               |

Die übrigen 21% verteilen sich auf die gemischten Fälle, wie in unserer Tabelle unter No. 4, 5, 6, 7 figurieren.

Was nun die Zahl der Anfälle anbetrifft, so schwankt sie sehr beträchtlich. Nach meiner Statistik fanden sich

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 13 Fälle mit 1 Anfall | ✕         |
| 6 „ „ 2 Anfällen      | 1         |
| 9 „ „ 3 „             | 0         |
| 9 „ „ 4 „             | 1         |
| 6 „ „ 5 „             | 2         |
| 6 „ „ 6 „             | 0         |
| 7 „ „ 7 „             | 2         |
| 3 „ „ 8 „             | 5         |
| 4 „ „ 9 „             | 1         |
| 8 „ „ 10-20 „         | 1         |
| 5 „ „ 20-30 „         | 3         |
| 2 „ „ 30-50 „         | 3         |
| 3 „ keine „           | 2         |
| 1 „ mehrere „         | 1         |
|                       | 0         |
|                       | <u>22</u> |

Es geht hieraus deutlich hervor, dass die Anzahl der Anfälle beträchtlichen Schwankungen unterworfen ist. Anderseits sieht man, dass nicht absolut behauptet werden kann, dass, je zahlreicher die Anfälle, desto grösser die Mortalität. Ich sagte nicht absolut, denn man findet auch Fälle, bei denen Eklampsische schon nach dem ersten Anfall gestorben sind, während andere nach 30 noch mit dem Leben davorkamen. Auch in der Literatur findet man diese meine Ansicht bestätigt. So zitiert *Ahlfeld* Fälle mit 182 Anfällen, *Rosenstein* solche mit 104, ja sogar mit 200 Anfällen, die noch geheilt sind. Freilich sind unsere 2 Fälle mit 30 Anfällen ad exitum gekommen, denn zweifellos werden durch die steigende Menge der Anfälle sekundäre Komplikationen, vor allem von Seiten der Lungen begünstigt, die auch im Wochenbett den Tod herbeiführen können; aber die Schwere des Leidens nimmt durchaus nicht immer mit der Zahl der Anfälle zu. Dass Anfälle von den Genitalien her auch durch Reize, die nicht Wehen sind, ausgelöst werden können, dafür spricht die Beobachtung, dass in einem Fall während der Dammnahrt die Eklampsie ausbrach. In einem andern Fall brach sie während der Vorbereitung zu einer entbindenden Operation aus.

In unserem Material findet man 3 Fälle von Eklampsie, die ohne Anfälle verlaufen sind und zwar 2 im Puerperium und 1 in der Gravidität. Davon war einer letal. Die Symp-

tome bestanden bei diesen Patientinnen in Kopfschmerzen, zeitweise Zuckungen in der Gesichtsmuskulatur und in den Extremitäten, Somnolenz, Bangigkeit auf der Brust, Amaurose, Erbrechen. Bei dem Fall in der Gravidität war aber nicht sicher festzustellen ob es sich um eine echte Eklampsie, oder ob es sich nur um eine Uraemie handelte.

Fälle von wiederholter Eklampsie sind in der Literatur verschiedene beschrieben. Unser Material weist auch einen solchen Fall auf. Unter wiederholter Eklampsie verstehe ich mit andern Autoren das Auftreten von Eklampsie bei mehreren Schwangerschaften derselben Frau. In der Literatur findet man manchmal diese Eklampsie als recidivierende bezeichnet. Diese Bezeichnung hat aber *Olshausen* für Fälle gewählt, wo die Anfälle bei einem gerade vorliegenden Falle von Eklampsie in grössern Zwischenräumen — über 24 Stunden und mehr — wiederkehren. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist es also besser für erstere, den einzig richtigen Namen: „wiederholte Eklampsie“ zu gebrauchen.

Ich lasse hier die Krankengeschichte von diesem interessanten Fall auszüglich folgen.

Journal No. 619. Jahr 1904. 37 J. alt. VI. P.

Schon bei einer frühern Schwangerschaft vor 2 Jahren eklamptische Anfälle. In den letzten 2 Monaten, Eiweiss und Oedeme zunehmend. In den letzten 8 Wochen Milchdiät.

19. VI. Zu Hause im Verlauf von 9 Stunden 10 Anfälle, der 10. während des Transportes in die Klinik. Seit dem 3. Anfall Bewusstsein nicht mehr zurückgekehrt. 2 mal M<sup>o</sup> 0,01 subcutan.

11. a. m. Eintritt in die Klinik. Verordnung: 4 gr Dormiol per clyisma, heisse Wickel, Dunkelzimmer. Anfänglich Besserung: Schwitzen. Von 12 - 1 Uhr 5 weitere Anfälle von 2—5 Minuten Dauer. Bewusstsein erloschen. Wehentätigkeit vorhanden. Urin gerinnt beim Kochen. 1 h 30 p. m. Muttermund 1-Frankstückgross. Extraktion der faultoten Frucht von VII Monat. Wickel. 2 gr Dormiol. Von 2 h 40 bis 4 h 20 p. m. 4 weitere Anfälle von durchschnittlich 3 Minuten Dauer. 5 h 10 p. m. Entfernung der zerfetzten Placenta Uterusspülung. Verordnung: 600 ccm<sup>3</sup> Kochsalzinfusion. Wickel. 20 gr Dormiol. 8 h 30 2 weitere Anfälle von 2 Minuten. Puls klein, sehr frequent. Stündlich Campher und Coffeëinjektion abwechselnd.

9 h 30 p. m. 450 ccm Kochsalzinfusion. 11 h 30 p. m. bis 2 h 40 a. m. (20. VI.) 4 weitere Anfälle von 2 Minuten Dauer. Bewusstsein noch immer erloschen. 7 h 40 a. m. 26. Anfall von 2 Minuten Dauer. Temperatur 39,7. Puls 160. Bewusstlosigkeit. Heisse Vollwickel. Schwitzen. 6 h 30 p. m. Kochsalzinfusion von 600 ccm.

21. VI. Noch immer Bewusstlosigkeit. Keine Anfälle mehr. Nährclyisma. Exitus letalis. - Die pathalogische Diagnose werde ich später anführen.

Im allgemeinen ist die wiederholte Eklampsie sehr selten, so dass man füglich sagen kann, es kehre die Eklampsie nach einmaliger Ueberstehung derselben so gut wie nie wieder. Einige Autoren wollen diese Erscheinung mit der Immunitätslehre erklären, wozu aber jeder Beweis fehlt. Einer dieser Autoren ist *Dienst*, der nach Beobachtungen und Untersuchungen an einer Anzahl von Eklampsiefällen in einer frühern Arbeit, die Ansicht vertritt, dass die Eklampsie durch eine Vergiftung des mütterlichen Blutes durch Giftstoffe zustande komme, die vom Foetus gebildet werden und in das Blut der Mütter übergehen soll. Am Schlusse dieser Untersuchungen nun stellt *Dienst* als eine bekannte Tatsache hin, dass Frauen, die einmal Eklampsie durchgemacht haben, gegen eine zweite Erkrankung „gewissermassen immun“ sind. Er sucht dies damit zu erklären, dass das betreffende Gift eine Eiweissverbindung sei: von einer Anzahl solcher Eiweissvergiftungen sei aber erwiesen, dass nach einmaliger Ueberstehung derselben eine gewisse Immunität gegen dasselbe Gift erworben wurde.

*Fett* dagegen kommt in seiner Dissertation über wiederholte Eklampsie zur Ansicht, dass die wenige Recidive, die er zusammenstellen konnte, vielleicht grösstenteils durch eine hochgradige Insufficienz der Nieren, wie sie bei einer chronischen Nephritis und gleichzeitiger Gravidität entsteht, zu erklären ist. Tatsächlich findet man in unserem Falle eine seit dem ersten Auftreten der Eklampsie fortdauernde Albuminurie.

Was den Gehalt des Urins an Eiweiss anbetrifft, so findet man in 4 Fällen keine Angaben darüber, in einem Fall ist keine Albuminurie vorhanden gewesen. In den übrigen 78 Fällen ist ein Gehalt an Eiweiss angegeben. Im Falle 64 findet man die Angabe von Spuren von Eiweiss; im Falle 37 wenig Eiweiss. In 4 Fällen heisst es, viel Albumen, in wieder andern 5 Fällen steht angegeben „Urin gerinnt beim Kochen“. Ausser diesen erwähnten Fällen findet man in den übrigen 67 Fällen den Eiweissgehalt des Urins in Prozenten ausgedrückt und zwar schwankt er von  $\frac{1}{2}$  % bis 45 % Volumenprozent. Wir finden also 95 % Eiweiss im Urin vorhanden.

Aus der Literatur entnahm ich folgende Angaben:

| Schauta   | unter 122 Fällen in 85,6 % Albumen |    |   |   |        |
|-----------|------------------------------------|----|---|---|--------|
| Lantos    | „                                  | 23 | „ | „ | 91,3 „ |
| Ingersley | „                                  | 77 | „ | „ | 93,2 „ |

| Goldberg   | unter | 76 Fällen | in | 90,79 % | Albumen |
|------------|-------|-----------|----|---------|---------|
| Olshausen  | „     | 168       | „  | 95,9    | „       |
| Zweifel    | „     | 129       | „  | 100     | „       |
| Meyer-Wirz | „     | 117       | „  | 98,3    | „       |
| Basel      | „     | 82        | „  | 95      | „       |

Die Eiweissmenge war eine ausserordentlich wechselnde und stand in keiner Beziehung zur Schwere des Falles. Nach aufhören der Eklampsie steigt der Urin und der Eiweissgehalt nimmt ab und verschwindet in manchen Fällen völlig schon nach 3—4 Tagen. In andern Fällen dagegen findet man noch Spuren von Eiweiss nach 2 Wochen. So verliess Fall 46 unsere Klinik nach 24 Tagen und der Urin wies noch 1% Eiweiss auf. Ebenso Fall 76 mit  $\frac{1}{2}$  %. Bei Fall 80 war der Urin bei der Entlassung noch trüb, ohne Eiweiss, enthielt aber wenig Blasenepithelien und viele Leucocythen. No. 28 wurde nach 28 Tagen entlassen mit noch 4% Eiweiss und zwar mit der Mahnung, sich daheim weiter behandeln zu lassen. Auch im Falle 65 fanden sich noch Spuren von Eiweiss im Urin bei der Entlassung. In Bezug auf die Formelemente sind die Angaben in den Krankengeschichten sehr mangelhaft. So im Falle 41 heisst es, Urin blutig; im Falle 77 wurden Leucocythen und Erythrocyten und Cylinder im Urin mikroskopisch nachgewiesen. Dasselbe ist auch im Falle 74 angegeben. In vielen Fällen musste der Urin mit dem Katheter gelöst werden, so z. B. in den Fällen 7, 8, 13, 16, 26, 77, 79.

Zwillinge wurden unter 82 Fällen 4 beobachtet. Also 4,8%. *Kosinsky* fand nach dem Münchner Material 4,17%. *Schauta* fand unter 309 Fällen 4,9%. *Löhlein* unter 325 Fällen 5,2%. *Goldberg* unter 81 Fällen 4,9%. *Olshausen* unter 200 Fällen 8%. *Bidder* gibt 7,4%; *Von Winckel* 11%; *Dührssen* 4,5%; *Büttner* 4,47%; *Meyer-Wirz* 4,27%; *Kopetsch* 5%; *Urfey* 7,55%; *Tietke* 8% Zwillingsschwangerschaften an. Es ist also sowohl in meiner als auch in andern Zusammenstellungen die Prozentzahl der Zwillinge unter den mit Eklampsie komplizierten Geburten bedeutend höher als unter den gewöhnlichen Geburten. *Ahlfeld* und *Olshausen* berechnen nämlich bei letzteren die Häufigkeit der Zwillingsgeburten auf 1,25%, *Goldberg* auf 1,07%, *Winckel* auf 1,2%.

Aus dem mir zur Verfügung stehenden Material von 82 Fällen starben 22, also 26,8% Mortalität.

Andere Autoren fanden folgende Sterblichkeitsziffern:

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| Hofmeier         | 39,4 | % |
| Schauta          | 36,5 | „ |
| Skanzoni         | 32,9 | „ |
| Ahlfeld          | 30   | „ |
| Löblein          | 28   | „ |
| Olshausen        | 25   | „ |
| Goldberg         | 24,7 | „ |
| Zweifel          | 22   | „ |
| Kopetsch         | 20   | „ |
| Veit'sche Klinik | 5,88 | „ |

Nach Wyder's Zusammenstellung beträgt die mittlere Mortalität bei Eklampsie für die Mütter 20 %.

Die Mortalität in Bezug auf die einzelnen Geburtsperioden ergibt folgendes :

|                   |      |   |
|-------------------|------|---|
| <i>Gravidität</i> | 22,7 | % |
| Andere fanden :   |      |   |
| Schauta           | 52,5 | „ |
| Löblein           | 31,6 | „ |
| Zweifel           | 22,7 | „ |

Also unsere Zahl stimmt der von Zweifel gefundenen überein.

|                                                                    |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---|
| <i>Geburt</i>                                                      | 5,5 | % |
| Andere fanden eine viel grössere Mortalität in dieser Periode so : |     |   |

|           |      |   |
|-----------|------|---|
| Lantos    | 73,5 | % |
| Rosthorn  | 68,1 | „ |
| Schroeder | 60,1 | „ |
| Schauta   | 40   | „ |
| Zweifel   | 12,9 | „ |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| <i>In dem Puerperium</i> | 29 | % |
| Andere fanden :          |    |   |

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| Schauta   | 26,5  | „ |
| Rosthorn  | 22,72 | „ |
| Schroeder | 20,2  | „ |
| Leopold   | 16,8  | „ |
| Zweifel   | 15,4  | „ |

Bei den gemischten Fällen dagegen finde ich eine viel grössere Mortalität. Ich nenne nämlich gemischte Fälle solche, bei denen die eklamptischen Anfälle in 2 Geburtsperioden auftreten, 2 z. B. in der Gravidität und Puerperium, oder Geburt und Puerperium. Also für Fälle, bei denen die Anfälle sowohl in der Gravidität wie im Wochenbett auf-

traten, ergab sich eine Mortalität von 50 %. Ebenso für solche, bei denen die Anfälle in der Geburt und Wochenbett auftraten 50 %. Doch ist diese Zahl viel zu klein, um daraus irgend einen Schluss ziehen zu können.

Die einzelnen Jahre sind entsprechend der sehr kleinen Reihe und der sehr verschiedenen Behandlung, aber in Bezug auf Mortalität verschieden.

| Jahr | Anzahl der Fälle | ✕ | %     |
|------|------------------|---|-------|
| 1901 | 6                | 3 | 50    |
| 1902 | 7                | — | —     |
| 1903 | 4                | — | —     |
| 1904 | 8                | 3 | 37,5  |
| 1905 | 7                | 2 | 28,5  |
| 1906 | 7                | 2 | 28,5  |
| 1907 | 7                | 2 | 28,5  |
| 1908 | 16               | 4 | 25    |
| 1909 | 9                | 2 | 22,2  |
| 1910 | 11               | 4 | 36,36 |

Bezüglich des tödlichen Ausgangs sind nach einigen Autoren die Mehrgebärenden im allgemeinen im höhern Masse betroffen als die Erstgebärenden. Unter 22 Todesfällen bei meiner Aufstellung sind 13 Erstgebärende und 9 Mehrgebärende, also:

|                 |          |        |       |        |
|-----------------|----------|--------|-------|--------|
| <i>Basel</i>    | für I P. | 15,8 % | P. P. | 10,9 % |
| <i>Kosinsky</i> | „        | 12,7 „ | „     | 10,1 „ |

Unsere Zahlen sind also denen von *Kosinsky* fast gleich und es resultiert also eine grössere Mortalität bei Erstgebärenden. *Olshausen* nimmt auch etwa das gleiche Verhältnis an.

Von andern Autoren wird berechnet:

|                 |          |         |           |         |
|-----------------|----------|---------|-----------|---------|
| <i>Schauta</i>  | für I P. | 37,3 %  | für P. P. | 44,8 %  |
| <i>Löhlein</i>  | „        | 20,5 „  | „         | 33,3 „  |
| <i>Goldberg</i> | „        | 21,4 „  | „         | 45,5 „  |
| <i>Zweifel</i>  | „        | 16,6 „  | „         | 5,5 „   |
| <i>Lantos</i>   | „        | 24,24 „ | „         | 33,33 „ |

Ich glaube, dass jede Statistik eine viel geringere Mortalität zeigen würde, wenn man bei ihrer Aufstellung nach dem *Lippmann'schen* Prinzip vorgehen würde, d. h. alle Fälle in Abzug bringen würde, die nach der Geburt eingeliefert wurden und ferner alle, die erst 6—12 Stunden nach dem ersten Anfall in klinische Behandlung kommen.

Was die Mortalität der Zwillingsmütter an Eklampsie betrifft, so starben von 4 Müttern 1, also 25 %. *Kosinsky*

findet 67 %, *Glockner* 10 %, *Schreiber* 41,6 %, *Löhlein* 80 %. Es ist ja anzunehmen, dass die Prognose der Eklampsie für Zwillingsmütter trauriger ist als bei Einzelgeburten. Ist doch hierbei eine viel längere Zeit auf das Zustandekommen eines reflektorischen Reizes auf die Gebärmutter gegeben. Dass ein zu frühes Einsetzen von Bewusstlosigkeit, Sopor und speziell des Comas prognostisch sehr ernst aufzufassen ist, ergibt sich aus vielen Krankengeschichten unseres Materials. Die von 22 Toten sind 15 entweder schon in tiefem Coma eingeliefert worden, oder das Coma trat nach dem ersten oder doch nach mehreren Anfällen auf.

Gehen wir zu den pathologisch-anatomischen Befunden über, so finden wir in den Krankengeschichten nur 12 Fälle von 22 bei denen eine Sektion vorgenommen wurde, bei den übrigen wurde sie verweigert.

Hier die Diagnose:

*Fall 1:* Eklampsia gravidarum. Nephritis parenchymatosa. Blutungen in Lungen- und Lebergewebe. Schlaaffe Pneumonie des rechten Lappens. Milztumor. Pia oedem.

*Fall 20:* Parenchymatöse und fettige Degeneration der Epithelien der Nierenkanälchen. Hirnoedem.

*Fall 22:* Eklampsie. Nephritis parenchymatosa. Lebernekrosen. Haemorrhagien. Degeneration adiposa cordis et necrosis myocardi. Lungenoedem. Augina necroticans. Haemorrhagia ventriculi.

*Fall 23:* Nephritis parenchymatosa. Pneumonia et gangraena pulmonum. Pleuritis, pericarditis purulenta.

*Fall 32:* Nekrose und Blutungen in der Leber. Leichte Trübungen in der Nierenrinde. Kleine Blutungen im Epi und Endocard. Oedem in beiden Unterlappen der Lunge.

*Fall 39:* Eklampsia puerperalis. Nephritis duplex. Nekrosis renis dextra. Nekrosis et Haemorrhagia hepatis. Hyperaemia und Oedema pulmonum. Degeneratio adiposa cordis. Cystitis et Pyelitis.

*Fall 41:* Haemorrhagia des linken Occipitallappens. Herzhypertrophie mit Dilatation. Nephritis parenchymatosa. Multiple Infarcte in der rechten Niere.

*Fall 60:* Thrombosen und Nekrosen der Leber. Verfettung der Nieren und Hirnoedem.

*Fall 63:* Urogenitalfistel. Ureter. Mastdarmfistel. Pyonephrose. Beiderseits chronische Lungentuberkulose.

*Fall 69:* Lungenoedem und Stauungserscheinungen der Organe. Ascites. Trübe Schwellung der Leber; Rundzellensarkom der Ovarien.

*Fall 77:* Schrumpfniere. Retinitis albuminurica. Haemorrhagien und Nekrosen der Leber. Exzentrische Herzhypertrophie. Arteriosklerose.

*Fall 81:* Eklampsie. Status puerperalis. Leichte Hypertrophie und Dilatation beider Herzteile. Chronische Lungentuberkulose. Pleuritis adhaesiva beiderseits. Multiple Nekrosen in der Leber. Rechtsseitiges Lungenoedem.

Durch diese pathologisch-anatomischen Befunde ist ein charakteristisches Bild der Eklampsie festgestellt, das, wie der erfahrenste Forscher auf diesem Gebiet, *Schmorl*, auf dem Gynaekologenkongress von 1901 sich ausdrückt, durch eine Summe, einen Komplex von Organveränderungen repräsentiert wird, welcher sich aus Nierenveränderungen, aus anaemischen und haemorrhagischen Lebernekrosen, aus Blutungen und Erweichungen im Gehirn, der Lungen, sowie im Herzen multiple Thrombenbildung zusammensetzt.

In 3 Fällen schloss sich der Eklampsie eine Psychose an, die alle nach ihrer Ueberführung in die psychiatrische Klinik geheilt wurden. Ich konnte in 2 Fällen nicht eruieren, welcher Art die geistige Störung war. In einem Fall bestand sie im wesentlichen aus einer hallucinatorischen Verwirrtheit. Wir finden also gleich wie *Goedeke* zirka 3%. *Olshausen* fand 6%, *Löhlein* 5%, *Dührssen* 4,4%, *Seitz* 4,4%, *Glockner* 7,5%, *Basel* 3,6%. Im allgemeinen ist es geradezu auffallend, wie selten Störungen der motorischen und psychischen Gehirntätigkeit nach dieser schweren Erkrankung zurückbleiben, wenn man bedenkt in wie hohem Masse gerade das Zentralnervensystem von der Intoxikation mit ergriffen wird. In allen 3 Fällen handelte es sich um Wochenbettseklampsie nach spontan erfolgter Geburt. Man gibt an, dass sie meistens am dritten Wochenbettage ausbreche. Das war aber bei uns nie der Fall, sondern in einem Fall brach sie am 2. Tage, in einem andern Falle auch 27 Stunden nach der Geburt und im dritten Fall brach sie sogar 7 Tage nach erfolgter Entbindung aus. Alle drei wurden in bewusstlosem Zustand eingeliefert und bei allen drei war Albumen im Urin.

Neuerdings hat *Seitz* als erster darauf hingewiesen, dass bei den Fällen, bei denen sich eine posteklampsische Psychose entwickelte, etwa 2—3 mal so viel Anfälle auftreten, als bei denen, die ohne psychische Störungen ausheilen. Das kann ich für keinen meiner Fälle bestätigen, denn in einem Falle kamen bloß 4 Anfälle, in einem andern 8 und im dritten 14 Anfälle vor.

Von 82 Müttern wurden 84 Kinder geboren, denn zwei verliessen unentbunden, aber geheilt, die Anstalt. Davon

kamen 46 lebend zur Welt, also 57,5 %. *Kosinsky* fand auch für das Münchner Material dasselbe Resultat; 27 sind entweder tot zur Welt gekommen, oder wurden wegen entbindenden Operationen perforiert. Also 33,75 % Mortalität. Die Sterblichkeit der Kinder ist grösser, wenn man noch die 4 Fälle hinzuzählen würde, die lebend auf die Welt kamen, aber kurz nach der Geburt starben. Von 12 auswärts Geborenen ist aus den Krankengeschichten nichts zu ermitteln. Unter den Totgeborenen sind auch solche inbegriffen, die maceriert zur Welt kamen. Die Prognose ist also für Kinder bei Eklampsie noch viel schlimmer als für Mütter. Die Kindermortalität beträgt für Basel 38.75 %, wenn man die 4 Fälle hinzurechnet, die kurz nach der Geburt gestorben sind.

Andere fanden :

|            |       |   |             |
|------------|-------|---|-------------|
| Zweifel    | 33    | % | aller Fälle |
| Glockner   | 43    | „ | „           |
| Olshausen  | 28    | „ | „           |
| Schauta    | 24,3  | „ | „           |
| Skanzoni   | 44    | „ | „           |
| Wyder      | 28,45 | „ | „           |
| Meyer-Wirz | 38    | „ | „           |

Unser Material weist einen Fall von Eklampsia beim Kinde auf, bei welchem wir 2—3 mal stündlich hochgradige Cyanose mit Krämpfen der Arme und Finger, besonders stark beim Trinken, beobachteten. Diese wiederholen sich an den zwei nächstfolgenden Tagen verschiedene Male. Es wurden Parathyreoidininjektionen gemacht und das Kind nach 29 Tagen mit der Mutter geheilt entlassen.

Im Anschluss daran, möchte ich an Hand meiner Statistik die Frage der Abhängigkeit der Eklampsie vom Fruchttod und Placenta kurz erörtern. Bekanntlich lehren neuere Theorien über das Wesen dieser Erkrankung, dass die Quelle des Eklampsiegiftes im Foetus oder in der Placenta zu suchen sei. *Winckel* hat den Satz aufgestellt, dass die Eklampsie nach Absterben der Frucht meistens aufhöre oder sich bessere und man zog daraus den Schluss, dass die giftigen Stoffe von Stoffwechselprodukten des Foetus stammen. Man sagte, die Eklampsie höre in solchen Fällen deswegen auf, weil nach Absterben des Foetus dessen schädliche Stoffwechselprodukte nicht mehr auf die Mutter übergingen. Unter unsern Fällen finden wir 5 mal Ausbruch

von Eklampsie trotz abgestorbener Frucht. Diese Fälle will ich kurz schildern:

1) 1902. Journal No. 599. 35 J. alt. I P.

VI.—VII. Monat. Zu Hause 1 Anfall. 23. VII.  $\frac{1}{2}$  3 p. m. beim Transport in die Klinik 2. Anfall; nachher Bewusstseinstörung.

3 h p. m. Innere Untersuchung: alles erhalten. Nach 2 Stunden wieder ein Anfall. Temperatur 38,3. Puls kräftig, 160. Urin 3‰ Eiweiss. Expektative Behandlung bis 12. VIII., wo ein maceriertes Kind spontan geboren wurde. Mutter nach 30 Tagen geheilt entlassen.

2) 1903. Journal No. 495. 27 J. alt. V P.

Zu Hause und in der medizinischen Klinik 12 Anfälle innert 10 Stunden.

27. V., 5 h 30 p. m. Eintritt ins Frauenspital in benommenem Zustande. 5 h 55 p. m. Anfall von 2 Minuten Dauer. 3,0 gr Dormiol per clyisma. Dunkelzimmer. 7 h 35 p. m. Anfall von 3 Minuten Dauer. Wieder 9 h 50 p. m. Anfall. Urin 12‰ Eiweiss. 28. V., 2 h a. m. Starke Unruhe. 3 h a. m. Ausstossung einer 27 cm langen macerierten Frucht. Mutter nach 17 Tagen geheilt entlassen. Im Wochenbett keine Anfälle mehr.

3) 1904. Journal No. 609. 37 J. alt. VI P.

Dieser Fall wurde in extenso bei der wiederholten Eklampsie angeführt.

4) 1909. Journal No. 1501. 30 J. alt. X P.

Seit einiger Zeit nierenleidend. Zu Hause 3 Anfälle, der eine von 10 Minuten Dauer. Oefters Kopfschmerzen. Flimmern vor den Augen. Bewusslosigkeit.

8. XI., 5 h 40 p. m. Eintritt in die Klinik. Starke Unruhe. Dunkelzimmer. Dormiol per clyisma. Nachher Ruhe und Schlaf. 9. XI., 8 h 50 a. m. schwacher Anfall von 2 Minuten Dauer.

*Innere Untersuchung:* Muttermund für 1 Finger durchgängig. Einleitung der Frühgeburt. Blasenstich, Metreurynter. 12. XI. 8 h 50 a. m. Ausstossung der matschen, 24 cm langen Frucht. Mutter nach 17 Tagen geheilt entlassen.

5) 1910. Journal No. 161. 33 J. alt. IV P.

Seit 14 Tagen Eklampsieprodrome. 25. I., 10 h a. m. 1. Anfall mit heftigen Krämpfen im Gesicht und in den Armen. Eiweiss 4,8‰.

11 h a. m. ein 2., schwächerer Anfall. Bewusstsein kehrte nach wenigen Minuten wieder.

11 h 45 a. m. Innere Untersuchung: Aeusserer Muttermund für einen Finger durchgängig. Innerer geschlossen. Cervix erhalten.

1 h p. m. Starker Anfall von 5 Minuten. Starkes, comatöses Stadium. Dann soporöser Zustand.

7 h p. m. 4. Anfall, 2 Minuten Dauer. 9 h p. m. Blasenstich mit dem v. Herff'schen Blassenstecher.

26. I. Kein Anfall mehr. Gegen Abend vereinzelte Wehen.

27. I., 6 h a. m. Kräftige Wehen alle 5 Minuten.

10 h 40 a. m. Spontangeburt. Complicato corpore des totfaulen Kindes.

Mutter nach 16 Tagen geheilt entlassen.

Aus diesen 5 Fällen geht es sehr deutlich hervor, dass die Eklampsie erst nach dem Fruchttod auftrat, denn alle waren maceriert. Trotzdem hat die eine Frau 16, eine andere sogar 26 Anfälle gehabt, die ad exitum gekommen ist. Solche Fälle beschreibt *Lichtenstein*, *Meyer-Wirz*, *Ols-hausen* und andere. Durch diese meine und die andern vielen in der Literatur vorhandenen Fälle verliert die foetale Theorie der Entstehung der Eklampsie ihre Bedeutung.

Bevor ich zur Besprechung der Therapie übergehe, will ich noch kurz auf die Prodrome eingehen und ferner den Zustand schildern von Solchen, die uns von aussen eingeliefert wurden.

Am häufigsten waren Oedeme (15 mal) der Ober- und Unterschenkel, resp. der Füße, in mehr oder weniger starkem Grade vorhanden; manchmal wird über Oedeme der Bauchdecken und des Gesichtes berichtet. Von Oedemen der Labien ist in unsern Fällen nie die Rede; über deren Zeitdauer waren die Angaben der Frauen sehr verschieden. Bei Einigen bestanden sie fortwährend in den letzten Monaten der Schwangerschaft, bei Andern traten sie 14 Tage vor der Niederkunft, bei wieder Andern bestanden sie seit 4 Wochen vor der Geburt. In 2 Fällen klagten die Patientinnen über Schmerzen in der Nierengegend. 7 Frauen klagten über Sehstörungen, wie Flimmern vor den Augen, Schwarzwerden vor den Augen und eine davon sogar über völlige und plötzliche Erblindung. 3 Frauen gaben an, dass sie in der letzten Zeit der Schwangerschaft sich häufig erbrechen mussten, andere klagten über wiederholtes Auftreten von Krämpfen im Gesichte und in den Extremitäten. Andere hatten unter Schwindel und Bewusstlosigkeitszuständen zu leiden. 3 Patientinnen gaben an, dass sie in der letzten Zeit der Schwangerschaft zeitweise an Aufregung litten.

Was nun den Zustand betrifft, in welchem uns die von aussen stammenden Eklamtischen eingeliefert wurden, so sind 7 Frauen im comatösen Zustand eingeliefert worden, von denen 3 ad exitum gekommen sind. 3 wurden im somnolenten Zustand uns zugeschickt und eine davon erlag der Eklampsie. 2 wurden in aufgeregtem Zustand in die Klinik transportiert und beide wurden geheilt entlassen. Von den

5 im benommenen Zustande in unsere Klinik eingetretenen starben 2 und eine kam in die psychiatrische Klinik, da ihr Geisteszustand trotz aller geübten Therapie sich nicht besserte. 10 waren bewusstlos bei ihrer Einlieferung und von diesen starben 5 und bei einer von diesen brach eine posteklampsische Psychose aus, deren Zustand die Ueberführung in die psychiatrische Klinik notwendig machte.

Aus dieser kurzen Erörterung geht also zur Genüge hervor, dass die ziemlich hohe Mortalität unserer Anstalt sich erklären lässt, denn ich stimme ganz und gar mit dem schon früher angeführten *Lippmann'schen* Prinzip überein, dass unsere Klinik eine viel geringere Mortalität aufweisen würde, wenn man alle die oben genannten Fälle und alle die erst 6--12 Stunden nach dem ersten Anfall in klinische Behandlung kommen, abziehen würde.

Was nun die Therapie anbelangt, so stehen wir heutzutage nicht viel besser als vor 20 Jahren. denn es ist uns bis jetzt nicht möglich eine kausale Behandlung einzuschlagen, da uns das Wesen dieser bösartigen Komplikation des Fortpflanzungslebens, trotz aller Forschungen auf diesem Gebiet, noch dunkel ist. Unser Tun ist also noch immer ein rein symptomatisches, das sich besonders gegen die Unterdrückung der Krämpfe richtet. Denn sie sind bei häufiger Wiederkehr von höchst ungünstigem Einfluss auf die Tätigkeit sowohl des Respirations- und Zirkulationsapparates. Je seltener die Anfälle auftreten, um so weniger ist der Eintritt von Lungenoedem und Herzlähmung zu befürchten. Es liegt daher am nächsten, dass man den Eintritt von neuen Anfällen zu verhindern, oder möglichst abzuschwächen sucht, um die genannten Gefahren recht weit fernzuhalten. Gemäss den vielen Theorien hat sich die Therapie nicht einheitlich entwickelt, sondern jeder Autor hat gemäss seiner Ansicht über das Wesen der Erkrankung gehandelt. Auf die Verschiedenheit der Ansichten sind dann die vielen Spezifika zurückzuführen, von denen jedes zwar mit grossem Enthusiasmus angepriesen, aber bald als nutzlos bei Seite gelegt wurde. Schon im Altertum findet man die abenteuerlichsten, bombastisch-fanatichen Prozeduren, die in einer Dissertation von *Bungart* beschrieben wurden; aber schon im grauen Altertum finden wir ein Verfahren, das heutzutage von manchem Autor wieder zu Ehren gezogen wurde. Ich meine die Prozedur von *Hypokrates*, bei Krämpfen die Gebärenden zu Ader zu lassen, ferner kalte und heisse Abgüsse und

Opiumdarreichungen empfahl, eine Behandlung die in der Jetztzeit zu den aussichtsreichsten gehört! Allein im Laufe der Zeit machte sich das Bedürfnis geltend, eine brauchbare Grundlage für die Behandlung der Eklampsie zu finden.

*Mauriceau* war der erste, der uns genauere Kunde von den Puerperalkonvulsionen und ihrer Behandlung gibt. Sein Buch „*Traité des maladies des femmes grosses*“ hat weiteste Beachtung gefunden und in französischen, deutschen und englischen Schriften des Jahrhunderts, welche der Geburtshilfe und den Frauenkrankheiten gewidmet sind, werden, wenn von Convulsionen die Rede ist, eigentlich immer nur die drei Prinzipie von *Mauriceau* wiedergegeben: Aderlass, möglichst rasche Entbindung, sowie Verpönnung aller Brechmittel. So entleerte *Haley* einmal innerhalb 24 Stunden 120 Unzen = 3600 gr Blut und die Patientin genas doch. Im übrigen huldigen auch *Puzos, de la Motte, la Chapelle* und andere dem Grundsatz „je mehr, desto besser“. Ausser dieser allgemeinen Blutentziehung hält man noch grosse Dinge auf blutige Schröpfköpfe am Nacken, Hals, sowie auf das Anlegen von Blutegeln an den Schamlippen oder um den After.

Innerlich konnte man sich nicht genug tun in der Verabreichung von allen möglichen und unmöglichen Arzneien, wie sie nur der bunte Schatz der mittelalterlichen Apotheke aufbringen konnte. In der Armenpraxis spielten die Extrakte von Regenwürmern die gleiche Rolle wie bei den Vermöglichen die Decocte von Austern; in den bessern Ständen verabreichte man möglichst komplizierte Mixturen, deren Hauptbestandteilen aus Hirschhornsalzen gebildet wurden. Ausgehend von der Vorstellung, dass, wie *Gehler* behauptet, viele durch ihre Schärfe die Nerven reizende Substanzen aus dem Körper durch Ausleerungen entfernt werden mussten und dadurch zugleich die Krämpfe erzeugende starke Ausdehnung des Magens und Gedärme gehoben werden konnte, waren von altersher die Purgantia und Emetica viel berühmte Mittel. Gegen Brechmittel kämpfte *Mauriceau* heftig an und bezeichnete sie mit *Halmiton* als geradezu den Tod beschleunigend für Mutter und Kind.

Auch über die Darreichung von Opium entbrannte ein heftiger Kampf. *Wiegand* preist dasselbe als Ruhe- und Friedensstifter, als die Panacé der Gebärenden; dagegen rieten *Volpeau, Mauriceau* und *Halmiton* davon ab und be-

zeichneten es als ein den Tod bringendes und beschleunigendes Mittel.

Als der wichtigste, zugleich aber schwierigste Faktor in der Behandlung der Eklampsie, galt von jeher die künstliche Einleitung der Entbindung, denn man befolgte dabei die Erfahrungslehre, dass vor Vollendung der Geburt die eklamptischen Anfälle nur selten oder gar nicht zum Stillstand kamen; dass sie aber nach Ausstossung der Frucht in der weitaus grössten Mehrzahl, wie abgeschnitten, aufhörten; endlich dass bei verzögerter Geburt Mutter und Kind die grösste Gefahr liefen. „Parto finito“ sagte Röderer 1776 „mox convulsiones cessant et mentis conscientia reddit“. Aber bezüglich dieses „Wenn“ und „Wie“ begegnen wir wiederum den allerverschiedensten Anschauungen. Die ältesten Aerzte dieser Periode vertraten mit *Mauriceau* die Ansicht, man müsse stets unter allen Umständen die Geburt möglichst rasche beendigen, um die Gefahr für Mutter und Kind zu beseitigen. *La Motte*, *Levret* und *Whatt* stimmten ihm bei. Aber diese radikale Methode, die gegenwärtig wieder in den Berliner Kliniken von *Bum* und *Franz* uneingeschränkt herrscht, behielt nicht lange die Oberhand und kam die Zeit, wo man nur in der äussersten Gefahr sich entschloss, die Geburt durch Kunsthilfe zu beendigen. In diesem Fall legte man entweder die Zange an, oder man machte die Wendung mit folgender Extraktion, oder man griff auch zum Kranioklast, wenn der Kopf sehr gross war oder das Kind bereits abgestorben war.

Die Behandlung der Wochenbettseklampsie gestaltet sich im allgemeinen sehr einfach; sie bestand im Aderlassen und Schröpfen, in der Darreichung narkotischer und nervenstärkender Mittel. Als Prophylaxe war Diät und geregelte Lebensweise von *Wiegand* empfohlen worden. Ein grosser Fortschritt war es, als man etwa Mitte des vorigen Jahrhunderts die Chloroformnarkose in die Therapie der Eklampsie einführte und somit die Mortalität derselben zu einem erheblichen Prozentsatz herunterzudrücken vermochte. Erst nach längerem Widerstreit fand sie allgemeine Anwendung. Indess wurde man durch Autopsien von Frauen, welche im Coma ad exitum kamen, belehrt, dass die protrahierte Chloroformnarkose eine höchst fatale akute fettige Degeneration der Herzmuskulatur herbeiführe. Es wurde daher mit Recht von diesen Dauernarkosen gewarnt und angegeben, dieses Narkotikum nur zu momentaner Unterdrückung der

Krampfanfälle zu benützen, eine Methode, von der heute noch Gebrauch gemacht wird.

*Gustav Veit* schlug nun in den 80er Jahren vor, die gewünschte Narkose durch grosse Mengen von Morphinum in subcutanen Injektionen herbeizuführen und er stieg dabei bis 0,02 ja sogar bis 0,2 gr innerhalb 4—7 Stunden. Gegen diese übertriebene Anwendung des Morphioms wendet sich auch *Dührssen* wenn er sagt, die Geburtshelfer haben nicht das Recht eine Methode anzuwenden, welche die Lebenschancen der Mutter vielleicht um wenige Prozente verbessern, jedoch die des Kindes um viele Prozente verschlechtere.

Ausgezeichnete Resultate hat in der neueren Zeit *Stroganoff* mit der medicamentösen Behandlung erzielt. Er hat nämlich mit seiner expectativen Methode, welche Morphinum mit dem von der französischen Schule, *Charpentier*, und von *Winckel* empfohlenen Chloralhydrat verwendet, unter 113 Fälle nur 6 Fälle verloren. Allerdings gibt er die Mortalität der Kinder nicht an, welche *Winckel* 77% bei Behandlung mit Chloralhydrat betragen soll.

Nach *Dührssen* soll Chloroform nur zur einmaligen Narkose behufs Ausführung der künstlichen Entbindung verwendet werden, dagegen bei Wochenbettseklampsien schliesst er sich der Meinung von *Winckel's* an, der Chloroform als vorläufiges beruhigendes Mittel bei jedem Anfall von Eklampsie im Wochenbett geben lässt, solange bis nach Beendigung des Anfalles Chloralhydrat angewendet werden kann. Dieses wird nach jedem Anfall entweder in wässriger Lösung oder mit Milch per rectum verabreicht. Was nun die von den französischen Autoren vorgeschlagenen Sauerstoffinhalationen anbelangt, so wurden diese von *Stroganoff* gleichfalls angewendet und zwar in Verbindung mit der Chloroformnarkose. Auch in unserer Klinik wurde diese Neuerung in einem sehr schweren Fall angewendet.

Was nun die therapeutischen Massnahmen betrifft, mit welchen am Frauenspital die Eklampsie behandelt wird, so waren diese teils rein medicamentös, teils geburtshilflich operativ, teils beide in Kombination, je nach dem Stande des Geburtsvorganges, in welchem die Patientinnen eingeliefert wurden.

Bei der medicamentösen Behandlung wurde im allgemeinen der *Stroganoff'schen* Expectativbehandlung der Vorzug gegeben, mit welcher gute Resultate erzielt wurden.

Leider liess sich Prof. v. Herff, namentlich durch die Berliner Berichte über vorzügliche Erfolge, die mit der Früh-, respekt. der Schnellentbindung erzielt wurden, verleiten, die expectative Behandlung zu verlassen und die Geburt so rasch wie möglich zu beendigen, in der Hoffnung, bessere Erfolge zu erzielen. Immer von der Absicht geleitet, den leidenden Frauen die beste Hilfe zu bringen, wurden im Laufe dieser 10 Jahre auch Mittel angewendet, die nach dem Erfinder als geradezu spezifische bezeichnet wurden. So hat Prof. v. Herff im Jahre 1905 das vom russischen Gelehrten Pohl auf den Markt gebrachte Spermin, das zur Bekämpfung von Autointoxicationen empfohlen wurde, ausprobieren wollen. Aber die Resultate mit dem bis zum siebenten Himmel gepriesenen Mittel waren derart, dass die Behandlung mit Spermin bald wieder verlassen wurde. Diese Sperminbehandlung, meist verbunden mit diaphoretischer Behandlung und Verabreichung von Dormiol, wurde in 8 Fällen angewendet, nämlich im Falle 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43; davon starben vier, nämlich 36, 39, 41, 42, also rund 50% Mortalität.

Als Prof. Vasalle die Theorie aufstellte, dass der Ausbruch der Eklampsie mit Veränderungen der Epithelkörperchen in Zusammenhang zu bringen sei und als folgerichtige Konsequenz seiner Theorie auch eine spezifische Behandlung derselben, durch Anwendung von einem Extrakt dieser Körperchen zur Bekämpfung dieses Morbus empfahl, so fühlte sich Prof. v. Herff veranlasst, in der Meinung, den leidenden Frauen zu helfen, dieses Mittel therapeutisch zu verwerten. So wurden fast sämtliche Erkrankte im Jahre 1908 mit Parathyreoidin behandelt, manchmal ausschliesslich mit diesem Präparat, manchmal kombiniert mit narkotischen Mitteln, sowie mit operativen Eingriffen. Von den 16 mit diesem Mittel behandelten Fällen starben 4, was eine Mortalität von 25% darstellt. Nach meiner persönlichen Meinung stellt diese Zahl ein günstigeres Resultat als die anderen Methoden. Sie wurde aber verlassen, weil eine Sterblichkeit von 25% noch viel zu hoch ist. Die günstigen Erfolge im Vergleich zu den andern Methoden sind vielleicht auf den Umstand zurückzuführen, dass in diesem Jahre die Erkrankungen leichter Natur waren als in andern Jahrgängen. Und in der Tat fanden wir im allgemeinen eine niedrige Anzahl von Anfällen, was immer prognostisch sehr günstig anzusehen ist. Alle 16 Fälle zusammen wiesen eine Gesamtzahl von 107 Anfällen auf, was durchschnittlich 6,6 Anfälle ausmacht.

Nach diesen mehr oder weniger befriedigenden Versuchen kehrte man zum Alten zurück, d. h. zur *Stroganoff*-schen Behandlung und man blieb ihr, abgesehen von kleinen Abänderungen im Prinzip treu. Wenn unsere Resultate nicht denen von *Stroganoff* gleich kamen, so sind verschiedene Umstände daran Schuld die ich hier näher erörtern will, damit nicht der Methode die Misserfolge zur Last fallen. Unsere Anstalt ist eben wie manche andere darauf angewiesen, solche Patientinnen aufzunehmen, die schon draussen im Privathause verschiedene Anfälle gehabt haben und bei welchen infolgedessen von einer Frühbehandlung nicht mehr gesprochen werden kann. Bei der Durchsicht unseres Materials sieht man in der Tat, dass dieser Umstand in unserer Statistik eine grosse Rolle spielt. Ich will hier jene Fälle anführen, die streng nach *Stroganoff* behandelt wurden, d. h. einer kombinierten Anwendung von Morphium und Chlorathydrat, dieses in der sehr empfehlenswerten Form des Dormioles (Amylenchlorathydrat) unterworfen wurden. Rein abwartend mit Hilfe von Dormiol in Verbindung mit Hydrotherapie und dringenden Operationen, jedoch ohne das Prinzip der Früh- und Schnellentbindung zu befolgen, wurden 23 Kranken mit 6 Todesfällen behandelt (No. 5, 6, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 44, 45, 63, 64, 65, 66, 67), also mit einer Mortalität von 26 %.

Die eigentliche *Stroganoff*'sche Behandlungsmethode, jedoch mit Dormiol und den nötigen Operationen, kam bei 18 Eklampsien in Anwendung mit 5 Todesfällen. No. 4, 17, 16, 14, 15, 19, 18, 29, 31, 34, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 81, 82) also mit 27.2 % Mortalität.

Aus den Jahren 1911—1913 Februar kommen noch 21 Fälle hinzu, die zumeist nach *Stroganoff*, eine ganze Reihe jedoch mit Aderlassen nach *Zweifel*, mit 3 Todesfällen behandelt worden sind. Im ganzen wurde die *Stroganoff*'sche Methode, mit oder ohne Aderlässe, seit 1901 41 mal mit 8 Verlusten = rund 20 % durchgeführt; abwartend wurden 65 Frauen mit 14 Verlusten = rund 21 % behandelt. Darunter befindet sich eine ganze Reihe von Schwangerschaftseklampsien bei denen die Krankheit ausheilte, die Frauen nach Tagen und Wochen ohne Rückkehr der Anfälle geboren haben. (Diese siehe *Lichtenstein*: „Die abwartende Eklampsiebehandlung“; Archiv für Gynaekologie 1912, welche Arbeit nicht mehr verwertet werden konnte.) Wenn wir also die Resultate von *Stroganoff* mit seiner Methode nicht

erzielt haben, so sind also unsere Misserfolge den früher-  
erwähnten Umständen zuzuschreiben.

Seit dem Jahre 1912 wird im Frauenspital streng nach  
Stroganoff-Zweifel verfahren. Es sind seitdem 19 Eklampsien  
mit 2 Todesfällen - 10% „wovon der eine einem Erweichungsherd  
in der Medulla oblongata nach Abklingen der Krämpfe er-  
legen ist; — eine Hoffnung, dass es fernerhin gelingen wird,  
die Sterblichkeit ganz erheblich herabzusetzen.

An geburtshilflichen Operationen wurden folgende aus-  
geführt :

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Klassischer Kaiserschnitt        | 1  |
| Expression                       | 1  |
| Metreuryse                       | 2  |
| Blasenstich                      | 10 |
| Perforation und Extraktion       | 8  |
| Zangen                           | 24 |
| Incisionen                       | 8  |
| Hohe Zangen                      | 2  |
| Vaginaler Kaiserschnitt          | 3  |
| Wendung auf den Kopf             | 2  |
| Dilatation nach Bossi            | 10 |
| Einlegen des Barney'schen Ballon | 1  |
| Kristeller                       | 2  |
| Dilatation nach Harris-Bonaire   | 1  |

Operativ im Sinne der Nierendecapsulation wurde nur  
einmal vorgegangen und zwar in einem desperaten Falle,  
weil die Patientin sich trotz aller Anstrengungen nicht besserte.  
Aber auch die Nierendecapsulation vermochte in diesem  
Falle den gewünschten Erfolg nicht herbeizuführen. Prin-  
zipiell wurde also diese therapeutische Massregel nicht an-  
gewandt. Zu diesen kommen noch bis Frühjahr 1913 zwei  
weitere Kranke, die beide durch diesen Eingriff nicht am  
Leben erhalten werden konnten.

Von andern therapeutischen Eingriffen wurden beson-  
ders solche angewandt, die eine erhöhte Tätigkeit der Nieren  
herbeiführen sollten. So wurden neben der nierenschonenden  
Milchdiät und kochsalzarmen Nahrung, Mineralwasser, wie  
Wildunger, Kalium Acetic. verabreicht. Auch die diaphore-  
tische Behandlung wurde in jenen Fällen, wo die Nieren  
nicht funktionierten, beansprucht in Form von heissen  
Wickeln, Schwitzbett, Phoenix à air chaud etc.; diese von  
*Breus* empfohlene Methode hat sich auf unserer Klinik, in  
Verbindung mit andern Mitteln, bewährt. Zur Anregung

einer gesteigerten Diurese und Diaphorese bedienten wir uns des öftern von Kochsalzinfusionen. Alle diese Methoden wurden in den früheren Jahren angewandt, sie fallen nunmehr seit der Einführung von *Zweifel's* Methode im Zusammenhang mit der *Stroganoff'schen* weg. In den früheren Jahren wurde die Venaesektion in 6 Fällen vorgenommen und zwar immer als Notbehelf, wo man alles ausprobiert hatte, aber sie vermochte nichts zu leisten, denn in allen 6 Fällen starben die Patientinnen und zwar an Lungenoedem. Die dabei entzogene Blutmenge schwankte zwischen 100 und 600 ccm.

Campher-, Digalen- und Coffeïninjektionen wurden öfters ausgeführt und sie bewährten in der Mehrzahl der Fälle ihren Wert als herzanregende Mittel. Ergotin wurde in Fällen von Blutungen angewandt. Auch Antipyretica wurde gebraucht.

Solange also die Frage der Eklampsie nicht gelöst ist, müssen wir die Therapie anwenden, welche die günstigsten Resultate aufweist.

Auf unserer Klinik hat sich nun die *Stroganoff'sche* Behandlung, manchmal nur rein expektativ, manchmal mit operativen Eingriffen verbunden, als die beste erwiesen. Infolgedessen wollen wir in diesem Stadium des Probierens dieselbe nicht verlassen, sondern sie vielmehr mit einem ausgiebigen Aderlass nach *Zweifel* einleiten. Die Früh- und Schnellentbindung soll fernerhin stark in den Hintergrund kommen, vielleicht ganz verlassen werden.

---

Zum Schlusse erfülle ich die angenehme Pflicht, meinem verehrten Lehrer, Herrn *Professor Dr. Otto v. Herff*, für die Zuweisung des Themas und die lebenswürdige Durchsicht der Arbeit, meinen herzlichsten Dank auszusprechen.



## LITERATUR

*Ahlfeld*: Lehrbuch der Geburtshilfe.

*Bumm*: Lehrbuch der Geburtshilfe.

*Runge*: Lehrbuch der Geburtshilfe.

*Eulenburg*: Realencyklopedie der gesamten Heilkunde. Aufl. 4.

*Kosinsky*: Dissertation. München 1909.

*Pollak*: Ueber Eklampsie Monographie.

*Schlichtig*: Eklampsie und Witterung. Berlin 1910.

*Fett*: Ueber wiederholte Eklampsie.

*Stroganoff*: Ueber 113 Eklampsiefälle mit 6 Todesfällen.

*Lichtenstein*: Ueber Eklampsie.

*Büttner*: Die Eklampsie im Grossherzogtum Mecklenburg - Schwerin.

---



